

L'ALIMENTATION DES NOUVEAU-NES PRESENTANT UNE FENTE PALATINE

A destination des maternités du Nord et du Pas-de-Calais

Centre de Compétence des fentes et malformations faciales du CHU de Lille

Fentes palatines

- Différentes formes anatomiques :



- Associées ou non à une fente labiale
- Diagnostic anténatal rare si pas de fente labiale



- Equipe pluridisciplinaire
- Calendrier chirurgical :
 - Lèvre et nez : ≤ 3 mois de vie
 - Palais (osseux+voile) : 10 mois
 - Alvéole : pendant l'enfance
- Pour toute difficulté alimentaire persistante :
 - Téléphone : 03 20 44 54 22
 - Mail : malface@chru-lille.fr

Particularités alimentaires

Succion :

- Aspiration difficile
- Faible initiation
- Désorganisation possible
- Préhension amoindrie si fente labiale

Déglutition :

- Propulsion linguale diminuée
- Passage nasal possible (bénin)

Allaitement :

- Au sein : aspiration nécessaire > biberon
- Pas d'obstination si allaitement difficile
- Lait maternel possible et recommandé : tire-lait, peau à peau, tétées plaisir...
- Sonde naso-gastrique non indiquée

Adaptations

- Positionnement :
 - Vertical pour éviter le passage nasal
- Temps de repas :
 - Pauses pour diminuer la fatigabilité
 - Prises alimentaires < 30 minutes
- Tétines :
 - Orifices larges
 - Tétines 2^{ème} âge en caoutchouc
 - A faire bouillir 2/3 fois pour ramollir
 - Base large et aide à la fermeture de bouche si fente labiale associée
 - Biberon Haberman si troubles respiratoires /de la déglutition ou si échec tétines en caoutchouc

