



## **ANNUAIRE DES MÉMOIRES**

# **BEGAIEMENT ET AUTRES TROUBLES DE LA FLUENCE**

**2009 - 2025**

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

**Bégaiement et troubles de la fluence**

**MAZAUD Emma (Nice)**

*Etude de l'effet d'une prise en soin ciblée sur la communication sociale pragmatique chez l'adulte qui bégaiet : étude de cas*

Dirigé par : CAROULLE Agnès, orthophoniste et GRAND Marie-Laure, orthophoniste

Résumé : Le trouble de la communication sociale pragmatique (TCSP) et le bégaiement sont deux troubles neurodéveloppementaux aux répercussions communes, conséquentes et persistantes sur la communication sociale pragmatique (CSP). A ce jour, aucune étude ne traite de la prise en soin (PES) de la CSP dans le bégaiement. Nous avons donc cherché à vérifier l'intérêt d'une intervention centrée sur la CSP chez l'adulte qui bégaiet (AQB). Notre objectif principal était de vérifier si une rééducation orthophonique de la CSP améliorerait la qualité des comportements sociopragmatiques chez l'AQB. Nous avons aussi souhaité mesurer les effets de l'intervention sur le sentiment de compétence du sujet en CSP, sur la fluidité de sa parole, et sur son positionnement sociocommunicatif par rapport à son bégaiement. Ainsi, à partir d'une étude de cas, nous avons mené un entraînement individualisé et coconstruit avec le sujet. Nos résultats ont montré une amélioration globale des compétences sociopragmatiques du sujet mais une persistance du sentiment de compétence faible ressenti en CSP, ainsi qu'une réduction des disfluences et de l'impact autoperçu du bégaiement sur sa communication au quotidien. Cette étude a donc démontré les bénéfices d'une telle intervention chez l'AQB, fondée sur les principes de l'Evidence-Based Practice (EBP) et plaçant au centre le patient. Elle pourrait désormais être reproduite à plus grande échelle et à plus long terme et être réinvestie en pratique clinique orthophonique.

Contact : [emmamazaud@gmail.com](mailto:emmamazaud@gmail.com)

FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANT(E)S EN ORTHOPHONIE

**TANTY Elise (Paris)**

*Apport de l'Imagerie par Résonance Magnétique : caractéristiques du timing articulatoire dans la parole bégue*

Dirigé par : HIRSCH Fabrice, chercheur et chargé d'enseignement à l'université et Richard Amélie, orthophoniste

Résumé : Le bégaiement, trouble de la fluence marquée notamment par des disfluences involontaires comme les répétitions, blocages et prolongations, nécessite une prise en charge orthophonique adaptée. Pour affiner les interventions, une exploration articulatoire approfondie, au-delà des seules données acoustiques, s'avère essentielle. Cette étude expérimentale utilise l'Imagerie par Résonance Magnétique pour explorer les spécificités spatio-temporelles de la parole bégue, en comparant le timing oro-laryngé entre la parole fluente et disfluente de six personnes qui bégaiet, ainsi qu'avec celle de sept locuteurs normo-fluents. L'analyse de 191 syllabes ciblées, via le calcul du Voice Onset Time (VOT) à partir de données articulatoires, a mis en évidence des particularités dans le timing articulatoire des locuteurs présentant un bégaiement, même en l'absence de disfluences. Les analyses statistiques ont montré un allongement et une variabilité accrue du VOT, ainsi que des comportements laryngés atypiques. Ces résultats traduisent une instabilité articulatoire suggérant un trouble moteur global. En cohérence avec la littérature existante, ils apportent de nouvelles informations venant enrichir une base majoritairement acoustique, soulignant l'importance d'études intégrant les niveaux glottiques et

ANNUAIRE DES MÉMOIRES

supra-glottique. Ces observations soutiennent l'efficacité de techniques orthophoniques ciblant l'établissement du voisement, comme la parole prolongée du programme Camperdown. Ces conclusions renforcent la pertinence de l'IRM comme outil de recherche prometteur pour une compréhension plus fine des mécanismes articulatoires sous-jacents au bégaiement, enrichissant l'approche orthophonique de ce trouble complexe et hétérogène.

Contact : [elisetanty75@gmail.com](mailto:elisetanty75@gmail.com)



ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

## Bégaiement et autres troubles de la fluence

### **ARGOMANIZ Angela (Lyon)**

*Effets de l'utilisation de la réalité virtuelle sur les adultes qui bégaient. Revue systématique de la littérature*

Dirigé par : DIDIRKOVA Ivana, chercheuse et GABORIAU Rénald, orthophoniste et chercheur

Résumé : Pour les patients qui bégaient, il semble essentiel de concevoir des approches pratiques et écologiques. Les Thérapies d'Exposition en Réalité Virtuelle (TERV) sont particulièrement prometteuses à cet égard. Elles offrent la possibilité de s'immerger dans un environnement virtuel sécurisant pour le patient, écologique et adaptable, permettant ainsi un entraînement efficace. Cette étude vise à synthétiser les recherches qui documentent les effets de la réalité virtuelle (RV) sur les adultes qui bégaient. Des recherches ont été effectuées dans 11 bases de données, et ont permis de sélectionner ensuite sept études pertinentes pour notre analyse. Malgré la diversité des résultats, les preuves actuelles ne permettent pas de parvenir à un consensus sur l'influence de la réalité virtuelle sur le bégaiement de l'adulte. Alors que la majorité des travaux retenus ne montrent aucun impact sur les scores d'évaluation du bégaiement, d'autres soutiennent qu'il subsiste une relation entre les niveaux de fluence et la thérapie d'exposition en réalité virtuelle (TERV), qu'elle soit positive ou négative. Par ailleurs, quatre études suggèrent une relation entre la réalité virtuelle et l'anxiété sociale liée au bégaiement, notamment le niveau d'anxiété qui est lié. Des recherches futures devront explorer davantage cette relation en prenant en considération ces différents paramètres.

Contact : [Argomaniz.ortho@gmail.com](mailto:Argomaniz.ortho@gmail.com)

### **BOUFFIE Colline (Amiens)**

*Effets de l'improvisation théâtrale sur les manifestations associées au bégaiement et au bredouillement : sensibilisation de la population orthophonique sur la prise en soin des comportements d'évitement et des émotions négatives propres à ces troubles*

Dirigé par : HAINSELIN Mathieu, chercheur et chargé d'enseignement à l'université et VALAT Marion, orthophoniste

Résumé : Les manifestations associées au bégaiement et au bredouillement, tels que les émotions négatives et les comportements d'évitement (CE), participent grandement à la pérennisation de ces troubles et altèrent la qualité de vie de ces personnes. Cette étude vise à mesurer les bienfaits de la pratique de l'improvisation théâtrale en groupe sur ces manifestations. Pour cela, des données recueillies lors de l'Improtour 2022 auprès de personnes qui bégaient et/ou bredouillent et d'un groupe contrôle ne présentant aucun trouble de la fluence ont été analysées. Les résultats sont probants et démontrent un effet positif de l'impro sur les émotions négatives et les CE. Par la suite, la diffusion d'un dépliant et

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

de vidéos auprès d'étudiants en orthophonie et d'orthophonistes a permis de les informer sur ces effets et sur le lien entre impro, orthophonie et manifestations associées aux troubles de la fluence. En remplissant un questionnaire de retour, les participants ont pu manifester la bonne compréhension des informations, la perception d'une forme adaptée des documents, l'intérêt pour le sujet et le souhait de se former davantage. Ainsi, ce mémoire enrichit les données actuelles sur la pratique de l'impro en orthophonie. Ses limites ouvrent de nouvelles perspectives d'études.

Contact : [coline.bouffie@gmail.com](mailto:coline.bouffie@gmail.com)

### **DAUTY Juliette (Caen)**

*Thérapie basée sur la désensibilisation par la réalité virtuelle chez des adolescents qui bégaient - étude de l'anxiété sociale*

Dirigé par : DIOT Pauline et DELOIRE Bénédicte, orthophonistes

Résumé : La réalité virtuelle est un support thérapeutique novateur. Elle peut notamment être associée aux thérapies cognitivo-comportementales pour viser une diminution de l'anxiété chez les personnes qui bégaient. Les études sur ce type de thérapies sont de plus en plus nombreuses. Cependant, elles sont peu à s'intéresser aux adolescents. Nous avons alors réalisé 8 à 9 séances d'exposition à la réalité virtuelle auprès d'adolescentes éprouvant une anxiété sociale liée à leur bégaiement. Nous avons mesuré cette anxiété avant et après l'intervention, grâce à l'échelle de Liebowitz.

Ce mémoire a mis en évidence une légère baisse de l'anxiété sociale mesurable chez les participantes. Après l'intervention, elles sont davantage désensibilisées face à leur bégaiement et les expositions leur ont permis d'expérimenter de nouveaux comportements et cognitions face à des situations problèmes. Ce mémoire appuie la nécessité d'investigations futures concernant les effets de la réalité virtuelle sur l'anxiété chez les adolescents qui bégaient.

Contact : [dautyjuliette.ortho@gmail.com](mailto:dautyjuliette.ortho@gmail.com)

### **DELORME Julia (Lyon)**

*État des lieux des évitements chez l'adulte qui bredouille*

Dirigé par : LEROY-FARGEIX Caroline, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : L'objectif de cette étude est de mieux connaître le vécu et le ressenti des adultes bredouilleurs, pour ainsi objectiver la mise en place de stratégies d'évitements et pour quelles raisons.

Pour répondre à cette problématique, une démarche sociologique a été envisagée. Dix entrevues semi-dirigées ont été menées auprès d'adultes bredouilleurs. Les résultats obtenus mettent en évidence différents types d'évitements plus ou moins présents chez tous les participants. Les raisons conduisant à réaliser ces évitements sont liées à des cognitions et croyances. En revanche, le degré d'impact du bredouillement sur le quotidien ainsi que le travail des évitements en prise en soin ont une incidence sur

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

la réalisation et l'identification de ces évitements. Ainsi, cette étude contribue à l'élargissement des connaissances sur l'adulte qui bredouille.

Contact : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

### **DESBIEF Apolline (Toulouse)**

*Vers la validation du protocole 2G2A © (Gestes de Grande Amplitude Articulatoire) : un protocole de rééducation du bégaiement et/ou bredouillement*

Dirigé par : PENDELIAU-VERDURAND Marine et VALAT Marion, orthophonistes

Résumé : Le protocole 2G2A © a été conçu par Marine Pendeliau-Verdurand, orthophoniste. Ce programme de technique motrice est à destination des adolescents et des adultes présentant un bégaiement et/ou un bredouillement développemental persistant. Il propose des exercices de renforcement des capacités motrices de parole et de l'hyper-articulation associée à une technique motrice. Son objectif est d'améliorer l'adaptabilité des capacités motrices de parole et de stabiliser le système moteur de parole des personnes concernées. Le protocole 2G2A © a déjà démontré son efficacité clinique dans deux études antérieures en 2017 et 2022 mais, jusqu'à présent, il n'a encore jamais été soumis à une validation scientifique, ce qui est normalement essentiel avant de tester l'efficacité. Dans ce contexte, l'objectif de ce mémoire est d'initier le processus de validation du protocole 2G2A © en vérifiant que le programme soit suffisamment bien construit et valide dans son contenu pour être proposé à des personnes qui bégaient et/ou qui bredouillent. Pour ce faire, nous avons sollicité l'avis de huit experts orthophonistes, via un questionnaire, pour évaluer la pertinence, l'adaptation et la représentativité du contenu du protocole. Puis, nous avons examiné le construit du programme en le corrélant aux références scientifiques sur lesquelles il repose. Les résultats obtenus confirment la solidité du protocole, mettant en lumière une bonne validité de contenu et de construction. Les experts ont mis en évidence la nécessité d'ajuster certaines composantes du protocole et ont confirmé l'importance d'intégrer ce programme de technique motrice dans une approche plus globale. Dans une perspective d'amélioration du protocole, des suggestions et ajustements ont été proposés. Des études ultérieures permettraient de valider le contenu de ces modifications et de réaliser une nouvelle étude d'efficacité sur un échantillon plus large de patients, afin de renforcer la qualité du protocole. Ainsi, le programme 2G2A © enrichit l'éventail thérapeutique de la prise en soin orthophonique du bégaiement et du bredouillement chez les adolescents et les adultes, avec des perspectives d'application aux enfants et aux personnes touchées par la maladie de Parkinson.

Contact : [apolline.desbief@gmail.com](mailto:apolline.desbief@gmail.com)

### **DROUET Juliette et Axelle CHAMARE (Rennes)**

*Conception et évaluation d'un carnet de suivi du bégaiement pour le jeune enfant*

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

Dirigé par : JOUBERTON Amy, orthophoniste et LACROIX Agnès, chercheuse

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluence débutant fréquemment chez le jeune enfant entre 2 et 6 ans. Environ 1 enfant sur 12 est concerné, mais il n'est à ce jour pas possible de déterminer lesquels retrouveront une parole fluide. Le carnet de suivi du bégaiement a été pensé pour les parents, dans un but d'information, de repérage et d'accompagnement du bégaiement. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'intérêt d'instaurer un tel outil dans l'accompagnement du jeune enfant qui bégaiet.

La première partie de l'étude a été consacrée à la conception du carnet et du questionnaire numérique. Ils ont par la suite été diffusés à l'échelle nationale, afin de recueillir l'avis des parents d'enfants qui bégaient, des orthophonistes, et des acteurs intervenant auprès de l'enfant (médecins, enseignants...). 200 réponses au questionnaire ont été recueillies puis triées pour être ensuite analysées.

Du fait de la faible diffusion du carnet en amont de la rééducation orthophonique, les réponses analysées ne permettent pas de mettre en évidence de façon significative la fonction de repérage précoce du bégaiement pensée pour le carnet. Toutefois, la majorité des répondants s'accorde pour dire que c'est un outil complet et facile d'utilisation qui peut être utilisé au cours de la prise en soin pour renforcer le partenariat parental, bien que son intérêt n'ait pas pu être incontestablement démontré pour le bilan orthophonique. Par ailleurs, le design du carnet et la qualité des informations ont été salués par les répondants. Les avis recueillis ont permis d'entrevoir des perspectives futures pour le carnet et d'envisager de possibles améliorations.

Cette étude a donc permis de mettre en évidence l'intérêt d'un outil de suivi pour les prises en soin du bégaiement en orthophonie, et il serait intéressant d'envisager la création d'autres supports similaires à l'avenir.

Contact : [axelle.chamare@gmail.com](mailto:axelle.chamare@gmail.com) ; [drouet.juliette12@gmail.com](mailto:drouet.juliette12@gmail.com)

### DUMOULIN Nina (Nancy)

*Analyse des erreurs d'articulation et de l'implication laryngée lors d'une activité de lecture au travers de l'IRM en temps réel : comparaison entre deux sujets qui bégaient*

Dirigé par : LAPRIE Yves, chercheur et DAUBIE Catherine, orthophoniste

Résumé : Tout individu présente des disfluences dites normales (répétitions de syllabes ou de mots sans tension, pauses silencieuses, hésitations) qui servent à réguler le flux verbal et à rythmer la parole. Les personnes qui bégaient, quant à elles, produisent des disfluences "pathologiques", ou bégayages, qui entravent donc l'intelligibilité du discours. Ces bégayages (prolongations, blocages, répétitions de phonèmes, de syllabes ou de mots) sont marqués par un clivage de la syllabe et/ou un excès de tension physique.

Afin d'objectiver ces particularités acoustiques et articulatoires, nous nous sommes appuyés sur l'IRM en temps réel qui offre un fort contraste des tissus internes. Cette technique d'imagerie novatrice permet de filmer le plus fidèlement possible l'ensemble du tractus vocal (des sinus et des lèvres jusqu'aux plis

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

vocaux), et de rendre compte des tensions laryngées, du placement des articulateurs et de leur coordination motrice. Nous avons étudié la lecture de phrases à voix haute chez des adultes présentant un bégaiement développemental persistant. Cet exercice évitait ainsi toute stratégie d'évitement des disfluences.

De ce fait, nous avons émis un ensemble d'hypothèses : en phonation, les bégayages se distinguent par leur type et leur répartition, par leur durée moyenne, par les phonèmes concernés, par leur position au sein du mot ainsi que par l'environnement articulatoire des disfluences identiques.

Pour répondre à ces hypothèses, nous avons comparé la lecture de deux personnes présentant respectivement un bégaiement sévère et très sévère. Ces bégayages ont plutôt affecté des phonèmes consonantiques occlusifs, et majoritairement situés en position initiale du mot. Les images IRM ont reflété l'absence ou l'instabilité motrice des articulateurs, ainsi qu'une articulation trop anticipée et non-voisée, voire un délai phonatoire.

Ainsi, l'IRM en temps réel apporte un nouvel angle de vue en termes d'analyse articulatoire et phonatoire. En France, nous ne sommes qu'aux prémisses de son adaptation, et ce, quel que soit le domaine d'étude concerné.

Contact : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

### GSTALDER Julie (Nantes)

*Elaboration d'un outil-vidéo de désensibilisation au bégaiement à destination des parents d'enfants qui bégaiendent*

Dirigé par : CHEREL Marine, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : Dans la prise en soin orthophonique du bégaiement, la désensibilisation vise à l'acceptation des bégayages. Cette technique s'avère pertinente auprès des parents d'enfants qui bégaiencent (EQB), qui rapportent des réactions et attitudes négatives liées au bégaiement de leur enfant. Cette étude vise à créer une vidéo pour les parents d'EQB, et à la pré-évaluer pour déterminer sa pertinence en tant qu'outil de désensibilisation d'accompagnement parental en orthophonie. À partir de témoignages de personnes qui bégaiencent et de parents d'EQB, la vidéo aborde trois thématiques : parler ouvertement du bégaiement, explorer les réactions émotionnelles des parents et valoriser l'EQB dans sa communication. La vidéo est évaluée auprès de 25 parents d'EQB via un questionnaire. Son visionnage provoque une variété d'émotions positives (admiration, intérêt, optimisme...) et négatives (tristesse, peur...), de nouvelles envies (parler du bégaiement avec l'EQB et/ou l'entourage, s'informer sur le bégaiement, rencontrer d'autres parents d'EQB), et des réactions cognitives (nouvelles questions sur le bégaiement). Ces réactions manifestent des changements chez les parents d'EQB, participant au processus de désensibilisation. Tous trouvent l'outil pertinent en orthophonie. Des pistes d'utilisation de la vidéo en orthophonie sont proposées.

Contact : [video.desensibiliser.begaiement@gmail.com](mailto:video.desensibiliser.begaiement@gmail.com)

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

### **GUILLET Magali (Nantes)**

*Prise en soin orthophonique du bégaiement de l'enfant à travers le programme d'intervention Palin Parent-Child Interaction (PCI) : état des lieux de la pratique en France et création d'un support d'information à destination des orthophonistes*

Dirigé par : SAMSON Florian, orthophoniste et chargé d'enseignement à l'université

Résumé : Le bégaiement de l'enfant doit être pris en soins précocement afin de favoriser la souplesse et la spontanéité de la parole, avec ou sans persistance des disfluences. Parmi les différentes stratégies de rééducation qui existent, le Palin Parent Child Interaction therapy (PCI) se positionne comme un outil d'intervention proposant un programme de guidance aux enfants et aux parents dans l'acceptation du bégaiement, le non-jugement et l'adoption d'une attitude positive vis-à-vis du trouble. Ce programme d'origine anglo-saxonne est encore méconnu en France et se voit limité par les divergences dans la constitution des systèmes de soin. Ainsi, notre étude s'est intéressée à la pratique des orthophonistes sur le territoire et notamment, à l'identification des facteurs qui limitent son utilisation et des adaptations qui en résultent. Pour cela, nous avons constitué un questionnaire à destination de tous ceux ayant suivi une formation et/ou ayant lu l'ouvrage de référence. Un support d'information a été créé à partir des différents témoignages recueillis. Ainsi, cette plaquette retrace, d'une part, les grands principes théoriques d'application du Palin PCI et d'autre part, les récurrences observées dans les adaptations qui fourniront aux orthophonistes des clés pour mettre en place le programme à l'issue de la formation.

Contact : [magali.guillet.orthophoniste@gmail.com](mailto:magali.guillet.orthophoniste@gmail.com)

## FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE

### **MARGERIT Jeanne (Brest)**

*Etat des lieux du vécu des personnes qui bégaient dans le domaine professionnel*

Dirigé par : MUNIER Laure et ADJARIAN Alexia, orthophonistes

Résumé : Outre les difficultés d'élocution des personnes qui bégaient, le bégaiement interfère également avec les domaines scolaires ou professionnels. À mesure que la société met l'accent sur l'inclusion des personnes handicapées dans le monde professionnel, le bégaiement sur le lieu de travail devient un sujet d'actualité qui mérite une attention particulière. L'objectif principal de cette étude est de dresser l'expérience des personnes qui bégaient afin d'identifier les manques et les besoins en matière d'adaptations dans le contexte professionnel. Pour cela, nous avons élaboré un questionnaire diffusé à des adultes porteurs de bégaiement qui sont actuellement ou ont été actifs dans le monde du travail. Les résultats principaux indiquent que les personnes qui bégaient considèrent leur bégaiement comme un potentiel obstacle à l'embauche, mais cela ne les empêche pas de postuler à des emplois. Elles constatent aussi que les promotions sont possibles et relativement fréquentes, et que leurs relations avec les collègues et les employeurs sont généralement satisfaisantes. De cette étude sont issues certaines perspectives jugées pertinentes pour les participants, comme le fait de mener des

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

campagnes de sensibilisation au bégaiement, construire une plaquette explicative à destination des employeurs ou encore organiser un séminaire d'éducation dédié à l'employeur aux troubles de la fluence. Pour conclure, l'étude fournit une première évaluation de l'expérience des personnes qui bégaientaient dans le milieu professionnel, bien que le faible taux de réponses au questionnaire limite la possibilité de tirer des conclusions générales.

Contact : [jeanne.margerit@gmail.com](mailto:jeanne.margerit@gmail.com)

### PENTEL Manon (Amiens)

*Accompagnement des orthophonistes dans la prise en charge de groupes chez les adolescents qui bégaientaient - élaboration d'un livret permettant la mise en place de groupes thérapeutiques d'improvisation théâtrale*

Dirigé par : VALAT Marion, orthophoniste et HAINSELIN Mathieu, chercheur

Résumé : De plus en plus de recherches s'intéressent aux bénéfices de l'improvisation théâtrale et plus particulièrement à ses effets sur l'anxiété et le bien-être. Manifestement, cette discipline répond aux problématiques des personnes qui bégaientaient et plus précisément des adolescents. Cette étude vise à proposer une prise en charge groupale par le biais de l'improvisation théâtrale à destination des adolescents qui bégaientaient. Nous avons donc souhaité accompagner les orthophonistes dans cette démarche en leur proposant une méthodologie détaillée. Cette méthodologie se présente sous la forme d'un livret comprenant des informations clés sur l'improvisation théâtrale, le cadre ainsi que des exercices individuels et de groupe. Celle-ci a été diffusée auprès d'orthophonistes prenant en charge des patients qui bégaientaient.

Les réponses recueillies démontrent bien que ce livret est utile à la pratique orthophonique. A terme, nous espérons que davantage de groupes d'improvisation verront le jour en rééducation.

Contact : [manonpentel66@orange.fr](mailto:manonpentel66@orange.fr)

### PRIMAS Marig (Lyon)

*Thérapie de Réduction des Évitements du Bégaiement (TREB®) : Apports d'une thérapie de rééducation du bégaiement*

Dirigé par : BAILLE BARRELLE Mariane, orthophoniste et NOEL Mailys, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : Le bégaiement est un trouble complexe, qui implique à la fois des manifestations visibles telles que les disfluences et les comportements superflus et une partie invisible : les pensées, les émotions et les croyances liées au bégaiement mais aussi les stratégies afin de le camoufler, comme les évitements de sons, de mots et de situations. Bien que de nombreuses thérapies aient vu le jour pour prendre soin du bégaiement de l'adulte, leurs résultats peuvent être discutés et ne sont pas toujours prouvés sur le

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

long terme. En parallèle à cela, la Thérapie de Réduction des Évitements du Bégaiement (TREB®) a fait son apparition à la fin du vingtième siècle et est de plus en plus utilisée. Cependant, son efficacité n'est toujours pas prouvée scientifiquement.

Notre mémoire se concentre donc sur les apports de la TREB®. À travers un questionnaire administré à 14 participant·e·s, nous avons mesuré la fréquence des évitements et la qualité de la communication avant et pendant la thérapie. De plus, nous avons recueilli des données qualitatives pour mieux connaître l'expérience que font les patient·e·s de la TREB®. Les résultats ont révélé une réduction significative de la fréquence des évitements et une amélioration significative de la qualité de communication. La thérapie semble plus efficace pour les personnes ayant un bégaiement ouvert en ce qui concerne la qualité de la communication. En outre, les participant·e·s font une expérience positive de la thérapie et iels ont manifesté un engagement vers un processus de changement, avec une meilleure acceptation de leur bégaiement et une vision plus positive de celui-ci. Malgré notre petit échantillon, ces résultats préliminaires sont prometteurs quant à l'efficacité de la TREB®. Des études supplémentaires avec des échantillons plus importants sont nécessaires pour consolider la validité de ces résultats.

Contact : [marig.primas@free.fr](mailto:marig.primas@free.fr)

### PRIORET Emma et MASSIAS Margaux (Marseille)

*La désensibilisation du bégaiement chez les enfants d'âge scolaire avec un bégaiement : création d'un album jeunesse*

Dirigé par : ROUZAUD Magali, orthophoniste

Résumé : Dans une société qui valorise la conformité à la norme, le bégaiement peut surprendre, susciter un malaise voire des rires et engendrer ainsi de réelles conséquences psychologiques et sociales. Cette réalité souligne l'importance de reconnaître l'impact significatif de ce trouble, et plus particulièrement sur les enfants d'âge scolaire avec un bégaiement car nous savons que leur bégaiement a un fort risque de persister à l'âge adulte.

Il est crucial d'accompagner ces enfants présentant un risque de bégaiement persistant, afin de prévenir d'éventuels comportements négatifs. L'acceptation joue un rôle central dans la gestion du bégaiement. Dans cette perspective, les orthophonistes jouent un rôle essentiel en menant un travail de désensibilisation auprès des enfants, incluant la psychoéducation, la gestion des émotions liées au bégaiement ou encore la gestion des moqueries.

Dans le cadre de ce travail, nous avons entrepris la création d'un album jeunesse destiné à être utilisé par les orthophonistes et les parents lors de séances de lecture partagée. Cet outil vise à aborder le sujet du bégaiement de manière décontractée, favorisant une meilleure compréhension et une acceptation positive du trouble chez l'enfant.

Contact : [emma.pr@orange.fr](mailto:emma.pr@orange.fr) ; [margauxmassias@outlook.fr](mailto:margauxmassias@outlook.fr)

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

### **ROUE Maelle (Poitiers)**

*Comparaison des profils sensoriels et tempéramentaux des enfants de moins de 7 ans qui bégaien et/ou qui présentent un trouble du développement du langage par rapport à des enfants fluents du même âge*  
Dirigé par : TOURNIER-BADRE Christine et AUNIS OUMGHAR Clément, orthophonistes

Résumé : Cette étude expérimentale s'inscrit dans un projet de recherche de plus grande ampleur se déroulant sur plusieurs années qui compare les profils sensoriels et tempéramentaux des enfants de moins de 7 ans qui bégaien et/ou qui présentent un trouble du développement du langage par rapport à des enfants fluents du même âge. La forte comorbidité du bégaiement et du trouble du langage justifie cette inclusion. L'objectif est de déterminer si des spécificités existent chez les enfants qui bégaien et/ou qui présentent un trouble du langage et d'observer s'il existe un lien entre le profil sensoriel et le tempérament. Pour ce faire, quarante-neuf enfants d'âge préscolaire ont été inclus dans cette étude pour la passation de deux questionnaires parentaux, le Profil Sensoriel de Dunn et le Questionnaire des Tempéraments de l'Enfant (traduit par Clément Aunis-Oumghar à partir du « Child Behavioral Questionnaire » de Rothbart). Les résultats n'ont pas montré de différences significatives entre les enfants pour les deux questionnaires. Cependant, des spécificités sensorielles et tempéramentales ont été mises en avant chez plusieurs enfants présentant un bégaiement associé ou non à un trouble du langage et chez plusieurs enfants présentant un trouble du langage isolé. Toutefois, des corrélations multiples, significatives et avec de forts coefficients de corrélation entre les tempéraments et les composantes sensorielles ont été observées, ce qui encourage à poursuivre les recherches et à intégrer ces deux dimensions dans l'évaluation clinique.

Contact : [maelle.roue@outlook.fr](mailto:maelle.roue@outlook.fr)

### **ROUTIER Juliette (Bordeaux)**

*Élaboration, mise en place et évaluation d'ateliers thérapeutiques à destination des parents d'enfants préscolaires qui bégaien*

Dirigé par : JOUBERTON Amy, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

Résumé : De nombreuses études soulignent l'importance de prendre en soin le bégaiement dès son apparition. Les parents, inquiets, cherchent désespérément des ressources avant le bilan orthophonique pour aider et accompagner leur enfant au mieux.

Cette étude vise à évaluer l'efficacité des ateliers thérapeutiques à destination des parents d'enfants pré-scolaires qui bégaien. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie familiale basée sur l'impact du bégaiement sur l'enfant, la sévérité et l'inquiétude des parents ainsi que sur leurs connaissances et leur savoir-faire.

Après avoir répondu à un questionnaire anamnestique, deux groupes randomisés de 10 parents ont participé à trois ateliers thérapeutiques. Ceux-ci étaient animés grâce à des infographies créées en

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

amont relevant les principaux conseils de la littérature et validés par un comité d'experts. Les parents devaient répondre à un questionnaire Palin-PRS avant et après chaque atelier.

Les résultats montrent une amélioration significative des trois sections entre T0 et T3 : réduction de l'impact du bégaiement sur l'enfant, diminution de l'inquiétude des parents et renforcement des connaissances et de leur confiance. Les parents ont apprécié le format ainsi que les conseils partagés.

Contact : [julietteroutier5@gmail.com](mailto:julietteroutier5@gmail.com)

### SAMMUT Estelle (Montpellier)

*Analyse des différences de vécu du bégaiement entre les hommes et les femmes : incidence sur leur vie sociale et professionnelle*

Dirigé par : CISZEWSKI Céline, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'université

**Résumé :** Introduction : En France, des milliers de personnes sont confrontées au défi du bégaiement. Ce trouble encore largement méconnu expose les individus concernés à des préjugés et des stéréotypes défavorables, fondés sur leurs difficultés de parole. Les normes de genre traditionnelles aggravent ces jugements en créant des attentes spécifiques en matière de parole fluide, notamment concernant la masculinité et la féminité. Cependant, le bégaiement ne se limite pas aux aspects visibles ou audibles, mais affecte le vécu intérieur des personnes qui en souffrent. Ainsi, nous nous sommes interrogées sur les expériences personnelles des individus qui bégaiendent, en examinant particulièrement les différences entre hommes et femmes.

Méthode : Pour cela, nous avons réalisé une enquête par questionnaires auprès d'un certain nombre d'hommes et femmes qui bégaiendent. Les participants ont répondu à des questionnaires issus de l'OASES, échelle étalement évaluant l'impact du bégaiement sur la vie quotidienne des personnes qui bégaiendent, la LSAS, échelle étalement de notation de la peur et de l'évitement dans les interactions sociales, et un dernier questionnaire créé spécifiquement pour l'étude. Ces différents questionnaires ont été auto-administrés via une plateforme en ligne. Les réponses recueillies ont été traitées a posteriori par une analyse qualitative et quantitative.

Résultats : Notre étude révèle que le bégaiement impacte de manière identique les hommes et les femmes qui bégaiendent dans leurs interactions et activités quotidiennes. Toutefois, les femmes expriment un niveau de confort significativement moindre dans le milieu professionnel par rapport aux hommes. Dans les interactions sociales, ce constat demeure similaire, bien que moins évident, puisque les hommes montrent une confiance plus faible qu'en milieu professionnel. Ainsi, le bégaiement contribue à renforcer des normes de genre bien établies.

Conclusion et perspectives : Pour généraliser ces résultats, il serait pertinent de mener cette étude auprès d'un plus large échantillon de participants. Il serait également intéressant de faire corrélérer toutes les réponses des participants entre elles. Par ailleurs, il est évident qu'il existe un important déficit de

## ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

compréhension du bégaiement dans la société en général. Il serait ainsi bénéfique de réaliser des actions de sensibilisation à grande échelle afin d'aider ces individus.

Contact : [estelle.sammut@gmail.com](mailto:estelle.sammut@gmail.com)

### VAYRETTE Elodie (Bordeaux)

*Création d'un outil de dépistage du bégaiement masqué auprès de la population adulte*

Dirigé par : DUCLOS Hélène, orthophoniste et OSTERMANN Hélène, orthophoniste

Résumé : Le bégaiement masqué est un trouble de la fluence encore peu étudié dans le monde scientifique. Actuellement, il n'existe pas de bilan ou de recommandations de la HAS qui ont été officialisés. Cela peut s'expliquer par le caractère « masqué » de ce bégaiement qui peut compliquer la reconnaissance et la compréhension de ce trouble. Il se définit par une dissimulation du bégaiement derrière diverses stratégies de masquage permettant de le rendre inaperçu, peu ou non audible. Ces mécanismes peuvent engendrer des impacts psychosociaux. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de créer un outil de dépistage du bégaiement masqué accompagné de son guide du praticien, avec l'aide d'orthophonistes experts, de patients diagnostiqués avec un bégaiement masqué et d'un psychologue. Compte tenu des défis émotionnels, sociaux et psychologiques, nous avons créé un questionnaire à destination des psychologues et des psychiatres. Nos résultats ont démontré une pertinence des outils proposés, une amélioration du niveau de connaissances sur le bégaiement masqué, ainsi qu'un bénéfice pour la pratique professionnelle. Cette étude est une avancée dans notre volonté de renforcer les liens pluriprofessionnels entre les orthophonistes et les professionnels de la santé mentale. Ces outils peuvent servir de base pour repérer des signes de bégaiement masqué ou encore ajuster des axes thérapeutiques. Dans le futur, il pourrait être intéressant de développer une campagne de sensibilisation en lien avec les troubles de la fluence pour le grand public afin de légitimer la souffrance et les impacts psychosociaux qui leur sont liés.

Contact : [elodie.vayrette@gmail.com](mailto:elodie.vayrette@gmail.com)

### TECHER Eline (Nantes)

*Prise en soin orthophonique du bégaiement et du bredouillement : recueil et analyse des expériences des patients adultes et synthèse à destination des orthophonistes*

Dirigé par : DIDIRKOVA Ivana, chercheuse et chargée d'enseignement à l'université et BAILLE-BARELLE Marianne, orthophoniste

Résumé : L'adulte qui bégaye et/ou bredouille est désormais reconnu comme un partenaire indispensable dans la recherche et la clinique orthophonique. Pourtant, aucune étude française interrogeant les expériences des patients ayant un bégaiement et/ou un bredouillement n'a été recensée. Ainsi, l'objectif de cette étude était de recueillir les vécus, besoins et conseils des adultes

ANNUAIRE DES MÉMOIRES 2024

ayant un bégaiement audible, masqué et/ou un bredouillement au sujet de leurs suivis orthophoniques au cours des 5 dernières années. Pour cela, un questionnaire a été diffusé entre octobre et décembre 2023. 46 réponses complètes ont été recueillies. Les résultats obtenus sont particulièrement encourageants et révèlent une tendance très positive et bénéfique concernant le vécu de la prise en soin, tant dans l'alliance thérapeutique que dans le contenu et les effets de la thérapie. Les participants ont également apporté de nombreux éléments, informations et conseils issus de leurs expériences. Les principaux résultats ont été synthétisés dans un document à destination des orthophonistes, afin que le savoir expérientiel des adultes qui bégaient et/ou bredouillent contribue à l'enrichissement des connaissances et des pratiques professionnelles en orthophonie. La poursuite de cette méthodologie d'enquête reconnaissant le savoir expérientiel des patients en orthophonie est encouragée.

Contact : [techer-eline@hotmail.fr](mailto:techer-eline@hotmail.fr)



## Année 2022-2023

### **BRUNATO Mathilde (Lyon)**

Les apports de l'improvisation théâtrale dans les prises en soin de groupe d'adolescents qui bégaient : Etude de cas multiples

Dirigé par : VALAT Marion, orthophoniste, et HAINSELIN Mathieu, chercheur et neuropsychologue

Résumé : L'improvisation théâtrale est une discipline en plein essor dans de nombreux domaines.

Ce mémoire a pour objectif d'étudier les bénéfices de l'utilisation de l'improvisation théâtrale dans les prises en soin de groupe d'adolescent·e·s qui bégaien. Une amélioration de la communication et de la qualité de vie est attendue. Quatre adolescent·e·s qui bégaien et qui participent à un groupe d'improvisation théâtrale ont été suivis pendant neuf séances réparties sur cinq mois. Des questionnaires ont été proposés avant et après l'intervention en groupe d'improvisation théâtrale animés par une orthophoniste formée à l'improvisation. Les résultats obtenus varient d'une personne à l'autre mais suggèrent des améliorations à la fois sur la communication et la qualité de vie. En effet, trois patient·e·s montrent une amélioration de leur communication ainsi qu'une amélioration de leur qualité de vie avec une diminution de l'anxiété sociale, des symptômes de dépression, une amélioration de la confiance en soi et de la spontanéité. Ces améliorations ne semblent pas corrélées au niveau d'appréciation de l'improvisation par les participant·e·s. La dépression sévère semble être un critère d'exclusion de ce type de prise en soin qui en devient inefficace, en effet la le quatrième participant·e montre plutôt une évolution négative.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

### **JUDIC Audrey (Nantes)**

Création d'une échelle de plainte évaluant l'impact d'un trouble de la fluence sur la vie professionnelle des personnes qui bégaien et/ou bredouillent

Dirigé par : CHEREL Marine et VIDAL GIRAUD Hélène, orthophonistes

Résumé : Les troubles de la fluence correspondent à des manifestations diverses pas toujours audibles ou visibles. Ils peuvent affecter de nombreux aspects de la vie de la personne qui bégaiet et/ou bredouille. Cette étude propose de créer une échelle de plainte évaluant spécifiquement l'impact d'un trouble de la fluence sur une activité professionnelle. La méthode suivie pour élaborer cette échelle consiste à interroger des personnes qui bégaien et/ou bredouillent au moyen d'un groupe nominal. Un groupe hétérogène de 7 participants a permis

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

d'identifier les difficultés rencontrées et rédiger les items de l'échelle de plainte. Ces items ont ensuite été évalués par 34 personnes qui bégaient et/ou bredouillent ainsi que par 13 orthophonistes via des questionnaires en ligne. Enfin, l'échelle de plainte créée a été testée auprès de 76 personnes qui bégaient et/ou bredouillent et auprès de 31 personnes normofluentes. Au cours de ces différentes étapes, l'outil a pu être révisé. L'outil créé permet à l'orthophoniste de recueillir la plainte du patient et cibler au mieux les besoins de ce dernier au quotidien.

Contact mail : [audrey.judic@outlook.fr](mailto:audrey.judic@outlook.fr)

**MARTIN Léa (Lyon)**

Etude de cas : analyse du bégaiement développemental persistant et du bégaiement neurogène acquis

Dirigé par : DESPORTES Emilie, orthophoniste, et DIDIRKOVA Ivana, chercheuse

Résumé : Le but de ce mémoire est de proposer une analyse acoustique grâce au logiciel Praat du bégaiement développemental persistant et du bégaiement neurogène acquis. Les données de la littérature ont relevé des différences notamment au niveau de la classe grammaticale des mots bégayés mais également en ce qui concerne la place des bégayages au sein des mots. Nous souhaitons donc grâce à une comparaison entre deux groupes mettre en évidence des différences au niveau de la durée des disfluences, de leur nombre, des catégories grammaticales des mots, de la position des bégayages au sein des mots mais également de la fréquence d'apparition des disfluences en position initiale dans le cas de combinaison de disfluences.

Contact mail : [lea.martin.82@gmail.com](mailto:lea.martin.82@gmail.com)

**PERSON Elodie (Limoges)**

Bégaiement et bilinguisme : influence de la longueur moyenne des énoncés chez des sujets qui bégaient - cas particulier du français et du mina

Dirigé par : GBEDAHOU Dodji, orthophoniste et chercheuse

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluence de la parole impactant environ 1% de la population. Ce trouble a de nombreuses conséquences sur le bien-être des personnes qui bégaient. Parmi les hypothèses étiologiques de ce trouble, le bilinguisme a été mis en évidence par certains auteurs comme impactant le bégaiement.

Si plusieurs études se sont penchées sur le sujet, très peu ont abordé les particularités syntaxiques du bégaiement chez la personne bilingue.

Nous avons donc décidé d'effectuer une étude comparative du mina, une langue parlée au Togo et au Bénin, et du français quant à la longueur moyenne des énoncés produits respectivement dans chacune des langues. Dans cette étude, nous avons analysé les corpus de cinq sujets bégues-bilingues en situation de langage spontané.

A l'issue de cette étude, nous constatons que le nombre de disfluences est significativement corrélé au nombre de propositions contenus par énoncés produits. En effet, plus les énoncés contiennent de propositions et plus le nombre de disfluences est élevé. De même que, le nombre de disfluences est plus élevé dans les énoncés en français (L2) qu'en mina (L1). Nous constatons également que les énoncés produits par les sujets sont moins longs dans la langue maternelle que dans la langue seconde.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

La poursuite de ces recherches dans d'autres langues que le mina et le français permettrait d'extraire certaines contingences et ainsi orienter de manière plus efficiente la prise en soins orthophonique des patients bégues bilingues.

Contact mail : [elodieperson.ortho@gmail.com](mailto:elodieperson.ortho@gmail.com)

**PICHON Maxence (Nancy)**

Création d'un outil orthophonique s'inspirant du genre poétique pour le travail de l'intonation chez les être-locuteurs bégues

Dirigé par : Pr. BAJRIC Samir, chercheur, et CISZEWSKI Céline, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la parole qui engendre des irrégularités rythmiques chez le patient. Le travail respiratoire permet notamment de rétablir les pauses dans le discours. La parole bégue est donc parfois aposodique, ce qui nécessite de travailler l'intonation en rééducation orthophonique, d'autant que la lecture de textes à voix haute offre au patient l'expérience d'une parole non-bégue. Nous avons souhaité proposer un corpus de 15 textes poétiques pour travailler les unités supra-segmentales de la langue en séance. Les orthophonistes de notre étude ont majoritairement trouvé notre outil pertinent et plus de 80% d'entre elles souhaitent l'utiliser. De plus, notre travail appréhende les rapports cognitifs que l'être-locuteur bégue monolingue entretient avec la langue. Celui-ci reste, au sens néoténique du terme (cf Théorie de la néoténie linguistique de Samir BAJRIĆ), locuteur confirmé. Au même titre que le locuteur lambda, il souffre d'incomplétude linguistique, ou peut-être même langagièr... le débat reste ouvert et nous abordons ces aspects dans notre mémoire.

Contact mail : [cabinetorthphoniepichon@gmail.com](mailto:cabinetorthophoniepichon@gmail.com)

**ZANOLETTI Léa (Lille)**

État des lieux des connaissances des médecins et puéricultrices de PMI concernant le bégaiement du jeune enfant. Conception d'un outil de repérage des disfluences et des manifestations cliniques.

Dirigé par : MIESZANIEC Anne-Charlotte et HALIMI Rachel, orthophonistes

Résumé : "Le bégaiement concerne 5 % à 8 % des enfants. Néanmoins, on ne peut prédire pour ces enfants si leur bégaiement s'estompera spontanément ou perdurera. Le repérage de ces enfants est donc primordial afin de débuter une prise en charge précoce et adaptée, et ainsi réduire le bégaiement et éviter la mise en place d'un cercle vicieux. Les professionnels de la petite enfance, et notamment des centres de PMI, sont concernés par ce repérage. Nous nous sommes donc demandé si les connaissances de ces professionnels étaient suffisantes afin de repérer les signes et les facteurs de risque d'un bégaiement chez le jeune enfant. Nous avons émis deux hypothèses, selon lesquelles ces professionnels manqueraient d'informations et d'outils afin de repérer un bégaiement précoce, et qu'un outil de repérage leur serait nécessaire.

Afin de faire un état des lieux de leurs connaissances dans ce domaine, nous avons élaboré puis transmis un questionnaire à 569 centres de PMI en France. Nous avons pu récolter par la suite 733 réponses de médecins et de puéricultrices.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Les résultats ont démontré que ces professionnels méconnaissaient certaines informations, telles que la cause du bégaiement ou encore les facteurs de risque d'en présenter un. Nous relevons également que les répondants étaient fortement en demande de conseils et d'outils d'aide au repérage.

Pour y répondre, et ainsi améliorer le repérage précoce de ces enfants, nous avons conçu un outil étant destiné à ces professionnels afin de les informer, les conseiller et les aider au repérage de ce trouble."

Contact mail : [lea.zanoletti@hotmail.com](mailto:lea.zanoletti@hotmail.com)



## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2021-2022****BOUNSER Emma (Bordeaux)**

Élaboration d'un outil thérapeutique de rééducation des habiletés sociales pour des groupes d'enfants et adolescents qui bégaient

Dirigé par : JOUBERTON Amy et DIX NEUF Léa, orthophonistes

Résumé : Le bégaiement est un trouble qui touche 1% de la population mondiale. Ce trouble se manifeste par des disfluences caractérisées par la présence de tension et d'une perte de rythme. Le bégaiement est un trouble complexe impactant tous les aspects de la communication ce qui retentit sur la qualité de vie et l'estime de soi des personnes qui bégaient (PQB). Nos recherches ont mis en exergue un intérêt thérapeutique pour les prises en charge collectives des PQB et notamment concernant le travail des habiletés sociales.

Face au constat du manque de support spécifique à la rééducation du bégaiement, nous avons élaboré un matériel de rééducation travaillant les habiletés sociales pour des groupes d'enfants et adolescents qui bégaient âgés de 8 à 15 ans. 28 orthophonistes ont évalué le matériel grâce à un questionnaire.

L'échantillon des orthophonistes interrogés est trop restreint pour émettre des conclusions, toutefois les résultats ont mis en évidence un intérêt des thérapeutes pour notre matériel. Les données quantitatives et qualitatives ont permis de décrire la pertinence, l'aspect ludique et l'utilité de ce support thérapeutique mais également des modifications et des suggestions d'amélioration. A l'avenir, nous souhaiterions soumettre à publication une version finale du matériel afin de produire un outil pertinent à la rééducation orthophonique du bégaiement.

Contact mail : [emmabounser@gmail.com](mailto:emmabounser@gmail.com)

**BOUNIARD Manon (Bordeaux)**

Élaboration d'un matériel orthophonique destiné aux enfants de 7 à 12 ans qui bredouillent

Dirigé par : NOËL Maïlys et DESPORTES Emilie, orthophonistes

Résumé : Le bredouillement est un trouble de la fluence, dont l'évaluation et la prise en charge sont inscrits dans le champ de compétences de l'orthophoniste. Pourtant, ce trouble est encore mal connu par de nombreux professionnels et aucun matériel spécifique à la prise en soin des personnes qui bredouillent n'existe actuellement, quel que soit leur âge. L'objectif de ce travail a donc été d'élaborer un outil orthophonique destiné

aux enfants de 7 à 12 ans qui bredouillent. A partir de la littérature scientifique, nous avons choisi les axes thérapeutiques et les supports du matériel. Des orthophonistes l'ont ensuite testé et ont rempli un questionnaire d'évaluation. La grande majorité de l'échantillon a jugé le matériel pertinent, utile, ludique et attrayant.

Le questionnaire a déterminé les améliorations à apporter au matériel, que nous allons modifier en confrontant ces retours cliniques aux données théoriques. Au vu des avis positifs des professionnelles interrogées, le matériel sera soumis à publication, afin d'étendre son utilisation à davantage d'orthophonistes et de patients.

Contact mail : [manonbouniard@outlook.fr](mailto:manonbouniard@outlook.fr)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## COMMUNAL Julie (Bordeaux)

Étude préliminaire : bégaiement et troubles de l'intégration sensorielle chez les enfants de moins de 7 ans

Dirigé par : TOURNIER BADRÉ Christine, orthophoniste

Résumé : De récentes études portant sur le tempérament et les capacités d'auto-régulation ont démontré que les enfants qui bégaient présentent des difficultés dans ces domaines. Partant de ce constat, et selon l'observation clinique selon laquelle certains enfants qui bégaient semblent avoir des particularités au niveau sensoriel, l'objectif de ce travail est de déterminer si les enfants qui bégaient de moins de 7 ans présentent plus fréquemment des difficultés d'intégration sensorielle que les enfants tout venants. Pour cela, nous avons interrogé 14 parents sur les tendances sensorielles de leur enfant grâce au questionnaire du profil sensoriel de Dunn. Cet outil, qui s'appuie sur la théorie de l'intégration sensorielle, fournit une idée du fonctionnement sensoriel de l'enfant selon 4 tendances de réactivité : l'hypersensibilité sensorielle, l'hyposensibilité sensorielle, la recherche de sensations et l'évitement de sensations.

Les principaux résultats de notre étude clinique suggèrent que les enfants qui bégaient présenteraient davantage de différences sensorielles, notamment au niveau du traitement de l'information sensorielle et les 4 tendances sensorielles décrites par Dunn sont retrouvées de façon homogène.

Mots-clés : *Bégaiement - Intégration sensorielle - Profil sensoriel*

Contact mail : [julie.communal@yahoo.com](mailto:julie.communal@yahoo.com)



## CONDROYER Léa (Lyon)

Effet de variables psycholinguistiques sur le bégaiement : comparaison d'un groupe d'adultes et d'un groupe d'enfants

Dirigé par : BURKHARDT Eléonor, orthophoniste et chercheuse, et HIRSCH Fabrice, chercheur et chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : Les recherches sur le bégaiement développemental augmentent, notamment dans le domaine linguistique où des études, majoritairement en langue anglaise, ont montré que certains paramètres du langage impactent les disfluences. La question de leur applicabilité en français s'est donc posée. Nos hypothèses étaient que les locuteurs qui bégaient seraient sensibles aux variables psycholinguistiques et que l'effet de ces variables serait différent pour les enfants et les adultes, comme établi dans la littérature anglophone.

Nous nous sommes intéressés à la classe grammaticale du mot, la longueur du mot, la position dans le mot et la position dans la phrase. Pour tester nos hypothèses, nous avons analysé des enregistrements de langage spontané de deux groupes de locuteurs francophones présentant un bégaiement, dix enfants et dix adultes. Ces enregistrements ont permis d'estimer la sévérité du bégaiement et de conduire deux types d'analyses. Dans chaque groupe, la différence entre les mots de contenu et de fonction, les mots monosyllabiques et plurisyllabiques, les syllabes initiales et non-initiales ainsi que les mots initiaux et non-initiaux a été calculée, en nombre de mots bégayés, nombre de disfluences produites et pourcentage de mots bégayés.

Ensuite, les deux groupes ont été comparés en pourcentage de mots bégayés sur les huit types d'unités linguistiques cités. La sévérité du bégaiement a également été prise en compte. Les résultats indiquent que les

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

enfants sont sensibles à la classe grammaticale (plus de bégaiement sur les mots de fonction) mais pas les adultes, que les adultes sont sensibles à la position dans le mot (plus de bégaiement sur les syllabes initiales) mais pas les enfants et qu'aucun des deux groupes n'est sensible à la longueur des mots ou à la position dans la phrase. Ces résultats, à nuancer en termes de sévérité de bégaiement et de taille d'échantillon, indiquent que le bégaiement est influencé par certains paramètres du langage.

Contact mail : [lea.condroyer08@gmail.com](mailto:lea.condroyer08@gmail.com)

**CORNILLOT-CLEMENT Coralie et PRIN Ludivine (Tours)**

Connaissance du bégaiement et des attitudes à adopter : que savent les étudiants en France ?

Dirigé par : COCHEREAU Audrey et CHATELAIN Nelle, orthophonistes

Résumé : Le bégaiement reste tabou et les personnes qui bégaientaient (PQB) sont encore victimes de stéréotypes. La littérature montre que les étudiants fluents ont une perception négative des étudiants qui bégaientaient, expliquant la présence de comportements stigmatisants. Or, l'apport de connaissances sur le bégaiement pourrait réduire ces stéréotypes négatifs. Préalablement, il convient de mesurer et qualifier les connaissances des étudiants. De plus, l'interlocuteur ayant une influence sur la parole de la PQB, connaître les attitudes soutenantes lors d'un échange avec celle-ci est essentiel.

Si plusieurs études internationales ont déjà été menées à ce sujet, aucune n'a été réalisée en France. Notre étude a pour objectif d'évaluer les connaissances des étudiants français sur le bégaiement et leurs attitudes face aux locuteurs qui bégaientaient. Nous avons donc élaboré une enquête par questionnaire auto-administré et informatisé. Nous avons recueilli 1015 réponses. Les scores des étudiants mettent en évidence que seuls 1% possèdent une bonne connaissance du bégaiement, 84% une connaissance moyenne et 15% une connaissance insuffisante. De façon générale, les étudiants connaissent peu les causes et la période d'apparition du bégaiement et ont peu conscience de sa persistance. Les résultats montrent un effet significatif du niveau d'étude, de l'âge et de la filière d'étude sur les connaissances et attitudes. A l'inverse, on ne retrouve pas d'effet de familiarité ni de genre. Aucune tendance n'émerge concernant le fait d'avoir déjà reçu des informations ou conseils. Enfin, 91,5% des étudiants souhaiteraient être informés sur les attitudes à adopter face à une PQB.

Ainsi, informer les étudiants en créant un outil de sensibilisation serait nécessaire et pourrait être mené dans le cadre de la prévention en orthophonie. Par ailleurs, au vu des résultats concernant la familiarité et dans une perspective de soin, il serait pertinent que l'orthophoniste porte une attention particulière à sensibiliser l'entourage de la PQB.

Contact mail : [coralie.cornillot@gmail.com](mailto:coralie.cornillot@gmail.com) // [prin.ludivine@gmail.com](mailto:prin.ludivine@gmail.com)

**DAVID Louise (Clermont-Ferrand)**

L'adolescent qui bredouille : Étude explorative et descriptive de l'impact du bredouillement sur la qualité de vie

Dirigé par : LEROY-FARGEIX Caroline, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Le bredouillement est un trouble de la fluence souvent abordé par la description de ses caractéristiques dans la parole. Aujourd'hui, une autre dimension tend à être prise en compte au sein des définitions du trouble : l'impact du bredouillement sur la qualité de vie. Le bredouillement est le plus souvent

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

diagnostiqué à l'adolescence, il paraît alors nécessaire que dans cette période, l'adolescent se construise et s'accepte tel qu'il est, sans que son trouble ne prenne une place prédominante.

C'est dans ce contexte qu'une étude explorative et descriptive a été menée. Elle vise donc à mettre en exergue l'impact du trouble et plus particulièrement les domaines de la qualité de vie impactés chez des patients en pleine période de croissance et de développement humain. Cette étude propose à l'adolescent bégaiisseur de s'auto-évaluer par l'intermédiaire d'un questionnaire. Dix-sept adolescents qui bégaiellent, âgés de 10 à 19 ans, ont participé.

Les résultats montrent que la qualité de vie serait impactée par ce trouble de la fluence et ce dans plusieurs domaines : scolaire, social, du bien être personnel et de la communication. Le domaine familial n'étant pas impacté par le trouble, il n'a pas été possible d'affirmer que, dans un environnement spécifique dans lequel le bégaiissement est très présent, le trouble a forcément un impact sur la qualité de vie de l'adolescent.

Contact mail : [louise.david278@gmail.com](mailto:louise.david278@gmail.com)

**DEFFAINS Elise (Besançon)**

Intérêt de l'utilisation d'un outil vidéo dans le processus de désensibilisation au bégaiement : étude portée sur le sujet qui bégaiet de 16 ans et plus

Dirigé par : DE CHASSEY Juliette, orthophoniste

Résumé : En provenance des pays anglo-saxons, un véritable mouvement de fierté autour du bégaiement émerge en France depuis quelques années. Porté comme une différence et non comme un trouble, cette vision colore désormais la pratique clinique avec comme mot d'ordre : la liberté de bégayer et en ce sens le « vivre avec » son bégaiement. Souvent mis à mal par tout un pan de répercussions intimes (pensées, émotions, sensations), le vécu du sujet est ainsi nécessaire à prendre en considération. Le travail de désensibilisation déjà existant en orthophonie apparaît adapté et marqueur de changement pour la PQB.

Notre étude s'inscrit dans cette volonté d'exposer le sujet au bégaiement, et ce pour deux raisons principales : l'amener à s'auto-observer et à évoluer dans son rapport au bégaiement. Ce travail a abouti à la création d'un outil vidéo de désensibilisation, basé sur les témoignages positifs et constructifs de cinq PQB âgées de 16 ans minimum. Notre objectif consistait à recueillir les réactions de leurs pairs face à ce visionnage, et ce, par le biais de cinq entretiens individuels semi-directifs. Ces échanges ont démontré une variété de réactions post- visionnage, reflet des différences de vécus. Toutefois, d'importantes difficultés pour verbaliser les émotions et les sensations ont été observées. Cela amène à penser l'intérêt d'un travail sur la prise de conscience de leur expériences internes en présence du bégaiement (pensées, émotions, sensations). Les témoignages ont créé un effet miroir permettant une démarche auto-réflexive et un partage du vécu intime.

De ces discours, il en ressort un intérêt crucial à placer le vécu du sujet au centre de notre démarche clinique. Modifier le regard qu'il porte sur lui-même semble le point de départ pour percevoir son bégaiement comme une différence et l'accepter comme tel.

Contact mail : [deffains.elise@gmail.com](mailto:deffains.elise@gmail.com)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**FOREST Sidonie (Rouen)**

Étude pilote - Création et pré-validation d'une tâche permettant d'objectiver un éventuel impact des facteurs prosodiques dans l'apparition des disfluences chez l'adulte qui bégaiet : accent de focalisation et contours mélodiques interrogatifs et déclaratifs

Dirigé par : LE GAC David, chargé d'enseignement à l'Université

Résumé : Si la dimension multifactorielle du bégaiement fait aujourd'hui consensus, les critères prosodiques pouvant entrer en jeu dans l'apparition et la manifestation de ce trouble sont peu étudiés dans la littérature. L'enjeu de cette étude est de créer et de pré-valider une tâche de pseudo-dialogues permettant d'identifier l'influence de facteurs prosodiques tels que la modalité interrogative, et déclarative ainsi que la focalisation dans l'apparition des disfluences chez l'adulte présentant un bégaiement développemental persistant.

Les premiers résultats obtenus à partir de l'analyse du corpus de deux locuteurs laissent supposer que les énoncés en modalité interrogative sont davantage porteurs de disfluences que ceux en modalité déclarative. En revanche, l'accent de focalisation ne semble pas être un élément aussi prédictif de l'apparition des disfluences. L'utilisation de cette tâche à plus grande échelle pourrait permettre d'infirmier ou de confirmer nos premières conclusions.

Contact mail : [sidonieforest@gmail.com](mailto:sidonieforest@gmail.com)

**JANOT Estelle (Lyon)**

La prise en soin du bégaiement chez les patients trisomiques : un état des lieux des pratiques actuelles

Dirigé par : PINA SANCHEZ Raphaëla, orthophoniste

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluence fréquemment observé chez les personnes trisomiques, davantage que dans le reste de la population. Cependant, les orthophonistes ne sont pas spécifiquement formés à sa prise en soin et ne semblent pas très outillés pour celle-ci.

Afin de savoir si les orthophonistes prennent en soin le bégaiement chez leurs patients trisomiques et de faire un état des lieux de leur pratique, 8 entretiens semi-directifs ont été réalisés. Ces entretiens, sur la base du volontariat, ont permis de détailler la prise en soin de 11 patients, que leur bégaiement ait fait partie du projet thérapeutique ou non. Les résultats montrent que, si la plupart des orthophonistes décident d'axer une partie de la thérapie sur le bégaiement, elles ne savent pas toujours comment s'y prendre.

Ainsi elles utilisent leurs connaissances sur le bégaiement des personnes non trisomiques et y ajoutent de nombreuses adaptations pour pallier les difficultés intellectuelles notamment. Quelques pistes de prise en soin sont exposées, et si elles ne sont pas toujours efficaces il semble tout de même pertinent de s'intéresser au bégaiement de ces patients. L'idée d'une création d'outils spécifiques ou adaptés des outils plus classiques émerge chez la plupart des personnes interrogées.

Contact mail : [estelle.janot@laposte.net](mailto:estelle.janot@laposte.net)

**KALUS Julia (Nancy)**

Étude des caractéristiques des disfluences produites en situations spontanées par des enfants présentant ou non un bégaiement

Dirigé par : DA SILVA-GENEST Christine et FAUTH Camille, chercheuses

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Résumé : Les objectifs de ce mémoire sont d'une part de déterminer quelles sont les caractéristiques présentes dans la parole des jeunes enfants en situations d'interaction spontanées qui permettent de distinguer des disfluences courantes d'un bégaiement et d'autre part de préciser si ces caractéristiques varient en fonction de la situation d'interaction. Pour ce faire, nous proposons une comparaison d'échantillons de parole d'enfants tout-venant et d'enfants présentant un bégaiement, recueillis dans une situation de récit d'expériences personnelles et une situation de jeu symbolique. Notre étude met en évidence le fait que la parole des enfants bégues présente des similitudes avec celle des enfants tout-venant.

Néanmoins, certains marqueurs différencient ces deux populations et permettent de signaler un bégaiement, notamment la fréquence de survenue de disfluences sévères, la position intra-syllabique des disfluences, certaines caractéristiques des répétitions et des prolongations, ainsi que la présence de signes de tension.

Nos résultats révèlent également que la nature de la situation d'interaction a un effet sur la survenue de disfluences. Ces données pourraient être intéressantes à prendre en compte pour l'évaluation et l'intervention orthophonique auprès des enfants présentant un bégaiement mais aussi pour mieux informer les parents sur les signes d'alerte qui constituent une indication de prise en soins dans le cadre d'un bégaiement naissant.

Contact mail : [ju.kalus@hotmail.fr](mailto:ju.kalus@hotmail.fr)

**MARCHADOUR Aurélie et MARMUS Lucie (Marseille)**

2G2A (Gestes de Grande Amplitude Articulatoire) : Validation d'un protocole de rééducation du bégaiement et/ou bredouillement

Dirigé par : PENDELIAU-VERDURAND Marine, orthophoniste et chercheuse. HIRSCH Fabrice, chercheur

Résumé : Objectif : Ce mémoire a pour objectif de valider l'efficacité du protocole 2G2A (Gestes de Grande Amplitude Articulatoire), conçu par Marine Pendelieu-Verdurand, orthophoniste. Le protocole est à destination des adolescents et adultes qui présentent un bégaiement et/ou bredouillement développemental. Il propose des exercices de renforcement des capacités motrices de parole et une technique d'hyper-articulation. A l'heure actuelle, seule une étude de cas unique portant sur ce protocole a été réalisée par son auteure. Les résultats obtenus se sont révélés très prometteurs. En partant de ce constat, il nous a semblé intéressant de réaliser notre étude sur le programme 2G2A afin de prouver son efficacité à plus large échelle.

Méthode/Matériel : Dix orthophonistes françaises et belges ont été formées au protocole 2G2A dans le but d'intégrer notre étude. Par la suite, 23 de leurs patients (de 10 à 49 ans) ont été inclus. Ils ont tous bénéficié de 15 séances d'orthophonie (7 heures 30 minutes en tout) au cours desquelles ils se sont entraînés au programme 2G2A. Avant et après ces séances, chacun des participants a été enregistré sur 2 mêmes tâches de parole : une description d'image et une tâche de discours spontané. En partant de ce corpus, nous avons analysé le pourcentage de syllabes bégayées, le pourcentage de temps bredouillé et la vitesse d'élocution. Parallèlement, un questionnaire d'autoévaluation de la qualité de vie des personnes qui bégaiencent et/ou bredouillent a été proposé aux patients avant et après le protocole.

Résultats : Le protocole 2G2A a un impact significatif sur la réduction du pourcentage de bégaiement, de bredouillement et de l'impact de ces troubles sur la qualité de vie. Les résultats sont moins francs en ce qui

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

concerne la vitesse d'élocution. Cette étude met en évidence que le protocole 2G2A est d'autant plus efficace chez les personnes qui bredouillent.

*Discussion :* Cette étude corrobore donc les recherches antérieures. Elle constitue une perspective encourageante concernant la rééducation des deux troubles de la fluence que sont le bégaiement et le bredouillement.

**Mots-clés :** *Bégaiement – Bredouillement – 2G2A – Hyper-articulation – Capacités motrices de parole - Stuttering – Cluttering – 2G2A – Hyper-articulation – Speech motor skills*

Contact mail : [marchadour.aurelie@gmail.com](mailto:marchadour.aurelie@gmail.com) // [luciemarm@gmail.com](mailto:luciemarm@gmail.com)

**TISON Emma (Bordeaux)**

Influence d'une prise en soins orthophonique du bégaiement développemental persistant sur l'estime de soi et l'anxiété sociale

Dirigé par : SAINT-GAL Hélène, orthophoniste et chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Le bégaiement développemental persistant est un trouble du rythme de la parole apparu durant l'enfance et n'ayant pas régressé. Les personnes qui bégaiencent décrivent souvent un vécu intérieur négatif consécutif au trouble de la parole (honte, gêne, anxiété). Ce vécu intérieur peut avoir un impact négatif sur la vie sociale et être responsable d'évitements de situations de communication. Aussi, la prévalence d'anxiété sociale est bien plus importante dans la population qui bégaiète que dans la population générale. Par ailleurs, une corrélation entre l'anxiété sociale et une faible estime de soi est relatée dans la littérature.

Dans cette étude, nous avons cherché à savoir si une prise en soins orthophonique du bégaiement, tenant compte de la globalité du trouble, pouvait augmenter l'estime de soi et réduire l'anxiété sociale des personnes qui bégaiencent. Pour cela, nous avons recruté onze patients de plus de 15 ans chez une même orthophoniste. Nous leur avons fait compléter l'Échelle d'Estime de Soi de Rosenberg et l'Échelle d'Anxiété Sociale de Liebowitz avant et après 8 séances de rééducation orthophonique. Puis, nous avons étudié l'évolution des scores. Les séances incluaient notamment des exercices fonctionnels progressifs ayant pour but de diminuer l'anxiété anticipatoire en désensibilisant le patient à certaines situations.

Nos résultats ont montré une diminution de l'anxiété sociale ainsi qu'une légère augmentation de l'estime de soi à la suite des 8 séances d'orthophonie. On note principalement une baisse des évitements de situations sociales.

Contact mail : [emma.tison@yahoo.fr](mailto:emma.tison@yahoo.fr)

**TRIKI Maria (Strasbourg)**

Etude de l'influence des mécanismes du bégaiement sur les capacités pragmatiques des enfants et adolescents bégues : étude qualitative et quantitative chez des enfants et adolescents bégues âgés de 8 à 13 ans

Dirigé par : LATOUR Yolaine, orthophoniste

Résumé : Le bégaiement est admis dans la littérature scientifique comme étant un trouble de la fluence. Les disfluences provoquées par le bégaiement interrompent l'échange verbal. Les demandes de répétition et les critiques de l'interlocuteur brisent la coopération nécessaire à une bonne communication. Plusieurs études montrent que ces situations touchent les différentes composantes de la communication, particulièrement la composante pragmatique. Cette dimension pragmatique du langage englobe à la fois l'acte social que représente la parole et les capacités à envisager l'autre. Elle représente un enjeu considérable dans le cadre du bégaiement,

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

en particulier chez les enfants et adolescents, où les études montrent des capacités verbales et non-verbales inférieures à la norme.

Nous avons choisi d'évaluer les habiletés pragmatiques chez des enfants et adolescents entre 8 et 13 ans, afin d'identifier les habiletés atteintes et de les mettre en lien avec les mécanismes connus du bégaiement afin de proposer un projet thérapeutique adapté en tenant compte des difficultés spécifiques identifiées.

Nous avons recruté un échantillon de 15 participants. L'évaluation s'effectue en 2 temps : une évaluation qualitative basée sur une grille d'observation des troubles pragmatiques et un test quantitatif des habiletés pragmatiques.

Cette étude révèle des difficultés concernant aussi bien l'aspect verbal que non-verbal du langage, soulignant la nécessité de tenir compte de la dimension pragmatique dans le cadre de la prise en soin du bégaiement.

Contact mail : [mariatriki@hotmail.fr](mailto:mariatriki@hotmail.fr)



## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2020-2021****COUCHOUD Marie (Lyon)**

État des lieux des connaissances des médecins généralistes et pédiatres sur le bégaiissement et élaboration d'un outil de dépistage.

Dirigé par : DESPORTES Emilie, Orthophoniste.

Résumé : Présentation du bégaiissement, du parcours diagnostique. Questionnaire d'état des lieux du bégaiissement. Outil de dépistage pour les médecins.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

**COURREGE Clémentine (Limoges)**

Rééducation orthophonique de patients présentant un trouble phonologique associé à leur bégaiement : tour d'horizon des pratiques cliniques.

Dirigé par : BORSI Naïs, Orthophoniste.

Résumé : De nombreuses incertitudes planent encore sur le bégaiement. C'est un trouble complexe aux multiples aspects. Plusieurs pathologies peuvent y être associées. C'est le cas du trouble phonologique. En effet, il apparaît

particularités concernant l'encodage, la mémoire et la complexité phonologique. Un orthophoniste peut donc être amené à prendre en soin un patient présentant conjointement les deux troubles. Une seule étude est parue sur le type de rééducation orthophonique à mettre en place. Cela a attiré notre curiosité et nous nous sommes questionnées sur ce qui en pratique est proposé par les orthophonistes.

Nous avons souhaité nous rapprocher au plus près des professionnels afin de connaître leur méthodologie de prise en charge de ces patients. Afin d'investiguer les pratiques de ces rééducateurs, nous avons mené des entretiens semi-dirigés. Ceux-ci nous ont permis de récolter des données à propos de l'adaptation du bilan orthophonique, du plan de soin et de la rééducation orthophonique menée. Nous avons mis en évidence que les orthophonistes modifient leur méthodologie de prise en charge. Les suggestions proposées sont fondées majoritairement sur l'intuition clinique des professionnelles.

Contact mail : [clementine.courrege.dian@gmail.com](mailto:clementine.courrege.dian@gmail.com)

**FERRANTE Sandrine (Bordeaux)**

Efficacité des différents traitements orthophoniques dans la prise en charge du bégaiement précoce : revue de littérature.

Dirigé par : LONGÈRE Elisabeth, Orthophoniste ; NOEL Maïlys, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement développemental est un trouble de la parole affectant la communication et qui a des répercussions importantes sur la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Les progrès de la recherche en génétique, en neuroimagerie dans ce domaine sont récents et ne nous permettent pas encore de comprendre totalement la nature de ce trouble. Nous ne sommes toujours pas en mesure de savoir quel bégaiement deviendra chronique et lequel aura une récupération spontanée. Dans ces conditions, une prise en charge orthophonique est vivement recommandée dès les premiers signes de bégaiement. Les orthophonistes ont à leur disposition différentes approches (directes ou indirectes) pour traiter ce trouble. Afin de pouvoir choisir la meilleure thérapie chez le jeune enfant, une démarche basée sur la preuve semble être la plus pertinente mais l'état de la recherche permet-il cette démarche ?

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[presence@fneo.fr](mailto:presence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Nous avons réalisé une revue de la littérature à partir des bases de données Pubmed et Scopus. Nous avons retenu 6 articles dont une étude rétrospective, deux essais cliniques non randomisés, un essai randomisé, un essai randomisé contrôlé et une méta-analyse publiés entre 2010 et 2019. Parmi ces essais, deux seulement sont des études comparatives entre plusieurs traitements : Lidcombe Program vs RESTART-DCM et Lidcombe Program vs Westmead Program.

La recherche en la matière est encore très limitée au niveau international. La robustesse de la preuve se révèle faible dans une grande majorité des essais. A ce jour, aucune preuve n'a pu être apportée en faveur d'un traitement dont l'efficacité serait meilleure pour éviter la chronicisation du bégaiement précoce. Le Lidcombe Program est le traitement qui a bénéficié du plus grand nombre d'essais mais des études à plus long terme mériraient d'être menées.

Contact mail : [sferrante710@gmail.com](mailto:sferrante710@gmail.com)

## **GHILLEBAERT Marine (Rouen)**

Mesure de l'impact du bégaiement sur l'accès aux soins médicaux des adultes qui bégaient.

Dirigé par : MENU Mathilde, Orthophoniste ; GODFRAIN Isabelle, Orthophoniste.

constituer un frein dans la réalisation de démarches nécessitant une communication orale. Le parcours de soins de santé de ces personnes pourrait alors être entravé par ces difficultés. Il semble important de déterminer l'impact du bégaiement sur l'accès aux consultations médicales car un renoncement aux soins pourrait entraîner des conséquences néfastes sur la santé. La qualité de vie des adultes qui bégaient serait alors davantage altérée. L'objectif de cette étude est de mesurer l'impact du bégaiement sur l'accès aux soins médicaux des adultes qui bégaient et d'identifier les raisons précises des difficultés rencontrées.

Pour répondre à la problématique, un questionnaire auto-administré à destination des adultes qui bégaient a été créé afin de recueillir leur témoignage concernant leurs éventuelles difficultés face au monde médical. L'analyse descriptive des réponses obtenues montre que le bégaiement n'a majoritairement pas d'impact sur l'accès aux soins mais qu'il peut mettre en difficulté certaines personnes. A partir de ces observations, il serait intéressant de modifier le questionnaire et d'interroger plus précisément les adultes qui bégaient afin d'aller plus loin dans la réponse à notre problématique.

Mots-clés : *Adulte – Bégaiement - Impact - Soins médicaux*

Contact mail : [marine.ghi59@gmail.com](mailto:marine.ghi59@gmail.com)

## **HABERT Julie (Lyon)**

Le bégaiement masqué : les impacts psychosociaux et leur prise en compte dans le suivi orthophonique.

Dirigé par : DIDIRKOVÁ Ivana, Maître de Conférences des Universités ; DESPORTES Émilie, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement masqué est un trouble de la fluence peu connu du grand public ainsi que des orthophonistes. Les personnes présentant un bégaiement masqué tentent par tous les moyens de passer pour fluides, en adoptant diverses techniques verbales et/ou comportementales. Le bégaiement n'est donc pas ou peu observable chez ces sujets. Or, il est bien présent et la souffrance est réelle. Le bégaiement masqué, bien qu'étant un trouble « invisible », peut être un réel handicap social et cacher un important mal-être.

Quelles sont ces stratégies et comportements adoptés par ces personnes qui bégaient masquées et comment se manifestent-ils ? Comment ce trouble est-il vécu, ressenti par ces personnes ?

## **CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Ce sont ces questions qui ont poussé à effectuer ce travail de recherche, et à proposer un questionnaire à destination d'individus concernés par ce trouble. Il leur a été demandé de s'exprimer sur l'histoire de leur bégaiement, leur vécu, leurs ressentis, l'installation du masque, leurs émotions, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur leur vie sociale. La majorité d'entre eux a souffert de ce bégaiement étant adolescent, et environ la moitié a encore un ressenti négatif. Presque une personne sur deux indique éprouver de l'anxiété à cause du bégaiement. Les principales raisons pour lesquelles ces personnes ont installé leur masque sont la honte, la peur du regard des autres et le poids des exigences sociales.

Les impacts psychologiques, émotionnels et sociaux sont objectivables et propres à chacun. Les orthophonistes sont les professionnels de la communication, et cette communication entravée est à démasquer et à apaiser. Les impacts psychosociaux et émotionnels sont à prendre en considération dans la prise en soin orthophonique. Celle-ci doit être ajustée et personnalisée, mais elle peut également être groupale. Une affiche informative a été créée au terme de cette étude.

Mots-clés : *Bégaiement de l'adulte – Bégaiement masqué – Stratégies de masquage – Psychosocial – Anxiété – Prise en soin orthophonique – Questionnaire*

Contact mail : [julie.habert24@outlook.fr](mailto:julie.habert24@outlook.fr)

## LAÜGT Apolline (Poitiers)

Élaboration et étude préliminaire d'une thérapie mélodique adaptée aux troubles de la fluidité.

Dirigé par : ZUMBANSEN Anna, Orthophoniste, chercheuse et chargée d'enseignement à l'Université ; BERLIOZ Laurence, Orthophoniste.

Résumé : Les troubles de la fluidité comme le bégaiement et le bredouillement sont des troubles caractérisés par une perturbation du rythme de la parole et des disfluidités. De nombreuses techniques permettant l'apprentissage d'une parole fluide ont été élaborées. Plusieurs études identifient l'utilisation du chant comme une technique à fort potentiel pour ces troubles. Ce constat est appuyé par les données de la neuro-imagerie. Les thérapies mélodiques ont déjà accumulé des preuves d'efficacité en réadaptation de l'aphasie, mais n'ont jamais été testées pour les troubles de la fluidité.

Notre mémoire étudie l'intérêt de l'adaptation d'une telle thérapie aux troubles de la fluidité. Une version préliminaire de protocole de Thérapie Mélodique Adaptée aux troubles de la Fluidité a été testée chez trois participants (13-48 ans) présentant chacun un trouble différent (bredouillement, bégaiement développemental ou neurologique). Leurs avis quant à la thérapie proposée ont été recueillis par des entretiens semi-dirigés et des questionnaires de satisfaction. Leur parole a également été analysée grâce à la Systematic Disfluency Analysis (SDA) ou au calcul de la vitesse articulatoire. Nos résultats montrent que la méthode a été considérée comme pertinente par le jeune participant atteint de bégaiement développemental. Pour tous les participants, la technique a facilité la fluidité de la parole pendant les exercices, mais sans transfert sur la parole spontanée. Certains éléments constitutifs de la thérapie proposée ont été retenus ou supprimés, selon les profils des patients. D'autres études sont nécessaires pour confirmer ou infirmer les tendances identifiées, et examiner le protocole chez un plus grand nombre de patients présentant des profils de fluence variés.

Mots-clés : *Bégaiement - Bredouillement - Parole - Thérapie mélodique - Rythme - Fluence - Fluidité*

Contact mail : [apo-laugt@hotmail.fr](mailto:apo-laugt@hotmail.fr)

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## LE DÉVIC Alice (Lyon)

L'impact de la complexité syntaxique sur le bégaiement de l'adulte.

Dirigé par : DIDIRKOVÁ Ivana, Maître de Conférences des Universités ; DIWERSY Sascha, Chercheur.

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluence en lien avec de nombreux facteurs, notamment le langage. L'impact de la complexité syntaxique sur le bégaiement a déjà été maintes fois étudié, mais rarement chez l'adulte et il n'existe que peu d'études chez l'adulte francophone. De plus, la complexité syntaxique n'a pas été mesurée de la même façon dans les recherches déjà menées. C'est pour cela que l'objectif de cette étude était d'analyser des énoncés de complexité syntaxique croissante, produits par 12 adultes francophones qui bégayaient et 12 adultes francophones normo-fluents appariés, afin de vérifier s'il existe un lien entre la complexité syntaxique et le taux de bégaiement. Le second objectif était de vérifier quel était l'indice de calcul qui reflétait le mieux la complexité syntaxique.

L'analyse s'est portée sur les 24 énoncés produits par chaque sujet lors d'une tâche de description d'images. La complexité syntaxique de chaque énoncé a été estimée avec trois indices de calcul : le MLU (Mean Length of Utterance), l'ISC (Index of Syntax Complexity) et l'IPSyn (Index of Productive Syntax). Les observations montrent que les adultes qui bégaient ont produit significativement plus de disfluences en fonction de l'augmentation de la

avéré. L'indice le plus pertinent pour expliquer les disfluences des adultes qui bégaient se trouve être le MLU. La complexité syntaxique d'une phrase peut donc se mesurer en fonction de sa longueur.

Ainsi, cette étude contribue à l'élargissement des connaissances sur le bégaiement de l'adulte francophone. Elle soulève un questionnement essentiel à prendre en compte tout au long du suivi orthophonique de ces personnes, à savoir s'il est plus pertinent de diminuer les exigences externes (notamment la complexité syntaxique des productions) ou d'améliorer les compétences langagières internes (spécifiquement la syntaxe).

Contact mail : [alice-breizh@hotmail.fr](mailto:alice-breizh@hotmail.fr)

## LIEURY Julia (Lyon)

Le bégaiement masqué de l'adulte : réflexion autour de l'élaboration d'un outil de bilan et création d'un support d'information à destination des orthophonistes.

Dirigé par : CISZEWSKI Céline, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement masqué est une forme de bégaiement qui existe chez un patient qui utilise toutes les stratégies pour que son bégaiement ne soit pas entendu ou visible. Les signaux sont les mêmes que dans la forme plus classique du bégaiement, mais avec des disfluences peu marquées. Les orthophonistes occupent une place centrale dans le parcours de soin des patients qui souffrent de ce trouble.

Toute prise en charge orthophonique commence par un bilan, acte officiel et obligatoire. Les grands axes du bilan du bégaiement de l'adulte permettent d'évaluer le bégaiement en tant que tel, mais aussi de comprendre ce qu'il a engendré dans le vécu du patient. Cependant, il n'existe en France aucune recommandation de bonne pratique pour ce bilan, ni de batterie officielle étalonnée en langue française. Au vu de la récence de la littérature au sujet du bégaiement masqué, ce mémoire s'interroge sur les besoins des orthophonistes en termes de savoirs théoriques, mais également d'outils, pour la pratique de ce bilan. Pour répondre à cette problématique, un questionnaire auto-administré a permis de recenser les réponses de 32 professionnels. Celles-ci ont soulevé un manque de connaissances théoriques chez les orthophonistes, qui pour certains, n'ont jamais entendu parler de ce trouble. Un support d'information de type brochure a été réalisé dans le but de répondre à ce manque. De plus, les orthophonistes ont pu exprimer le besoin d'un outil spécifique au bilan du bégaiement masqué. Pour répondre à cela, une réflexion est menée autour d'une réadaptation de l'iceberg de Sheehan comme outil de bilan

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

évolutif. Une étude scientifique pourrait être proposée dans la perspective de valider les effets de l'utilisation de cette métaphore.

Mots-clés : *Orthophonie – Bégaiement masqué – Adulte – Bilan – Besoins – Savoir – Outil – Métaphore de l'iceberg.*

Contact mail : [julia.lieury@gmail.com](mailto:julia.lieury@gmail.com)

## MONLEAU Lola (Toulouse)

L'information aux pédiatres sur le bégaiement des enfants de moins de 6 ans.

Dirigé par : LAPÉBIE Esther, Orthophoniste ; BERRA Julien, Médecin.

Résumé : Environ 600 000 personnes, soit 1% de la population française, ont un bégaiement.

Nous savons aujourd'hui que la prise en charge précoce du bégaiement est importante, puisque nous ne pouvons pas savoir quels enfants bénéficieront d'une récupération spontanée.

Nous avons souhaité interroger des orthophonistes et des pédiatres, au travers de deux questionnaires, pour connaître leur vécu et leur ressenti à ce sujet et évaluer si les pédiatres auraient besoin d'informations supplémentaires pour mieux prendre en charge le bégaiement des enfants de moins de 6 ans.

Ce mémoire a permis la création d'une fiche d'information à destination des parents et des pédiatres.

Contact mail : [lola.monleau@hotmail.fr](mailto:lola.monleau@hotmail.fr)

## POINOT Marie (Lyon)

L'accommadation phonétique entre la parole fluente et non-fluente.

Dirigé par : DIDIRKOVÁ Ivana, Maître de Conférences des Universités.

Résumé : La théorie de l'accommadation étudie l'imitation inconsciente qui s'opère lors d'une conversation entre deux individus. L'étude présentée ici s'est intéressée au bégaiement, qui est un trouble de la parole et de la communication, sous l'angle de cette théorie. Ainsi, l'impact d'une parole fluente sur une parole non-fluente a été mesuré grâce aux paramètres vocaux comme la fréquence fondamentale, les formants, le shimmer, le jitter, le ratio bruit-harmonique (HNR) et le délai d'établissement du voisement (VOT).

L'objectif de cette étude était de mesurer si la voix des participants s'était rapprochée ou éloignée de celle de l'intervenant après une conversation.

Pour ce faire, une tâche de lecture de mots bisyllabiques a été proposée à 11 personnes qui bégiaient et à 11 personnes normo-fluentes en pré-test puis en post-test. La tâche test consistait à lire des dominos verbaux en alternance avec l'intervenant afin de créer un tour de rôle verbal, comme lors d'une conversation spontanée.

Les résultats ont montré une tendance à la divergence des personnes qui bégiaient, bien qu'elles aient convergé sur certains paramètres. Ainsi, les personnes normo-fluentes ont davantage convergé que les personnes qui bégiaient. Un effet non significatif de la sévérité du bégaiement a été retrouvé. Un effet significatif du genre a été observé : les hommes ont plus convergé que les femmes. L'hypothèse que l'accommadation dépend du paramètre vocal étudié est alors validée : certains paramètres ont convergé tandis que d'autres ont divergé.

Les résultats n'étant pas significatifs pour la plupart, il serait souhaitable de répliquer cette étude en augmentant le nombre de sujets. De plus, une étude similaire étudiant l'impact de la parole non-fluente sur la parole fluente permettrait de conclure à une symétrie ou une asymétrie de l'accommadation. Enfin, l'utilisation d'un autre protocole permettrait d'étudier d'autres formes d'accommadation, comme l'accommadation lexicale ou syntaxique.

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Mots-clés : Voix - Bégaiement - Convergence - Accommodation - Alignement - Adulte - Phonétique  
Contact mail : [marie.poinot@free.fr](mailto:marie.poinot@free.fr)

**ROBIN Carole (Montpellier)**

Apports du médium peinture dans la pratique orthophonique chez des enfants d'âge scolaire porteurs de bégaiement.

Dirigé par : SUIRE Claire, Orthophoniste et art-thérapeute.

Résumé : La prise en soin du bégaiement est complexe car ce trouble est lui-même fluctuant et difficile à cerner. En proposant une approche issue de l'art-thérapie - c'est-à-dire en intégrant des médiations artistiques au sein des séances orthophoniques - il est possible de prendre en soin le bégaiement d'une manière différente. Nous nous sommes demandé si l'apport des médiations artistiques dans le champ orthophonique avait des effets positifs sur des troubles langagiers comme celui du bégaiement. Notre mémoire étudie l'intérêt de l'utilisation d'un de ces médium, le médium peinture, intégrée à une prise en charge orthophonique chez des enfants d'âge scolaire porteurs de bégaiement. Nous avons proposé des ateliers avec ce médium peinture à des enfants porteurs de bégaiement afin d'évaluer les effets sur leur langage mais aussi sur leurs émotions, leur respiration ainsi que leurs

bégaiement ainsi qu'une diminution de l'anxiété, une détente corporelle et des émotions positives. En revanche, la petite taille de notre échantillon de sujets étudiés ne nous permet pas de généraliser nos résultats à une plus grande échelle.

Mots-clés : Orthophonie - Bégaiement - Médium peinture - Médiation artistique - Enfants.

Contact mail : [carolerobin7@gmail.com](mailto:carolerobin7@gmail.com)



**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2019-2020****AUTRAN Louise (Tours)**

Nouvel outil d'évaluation du bégaiement apparent chez l'adulte : élaboration de classes de sévérité.

Dirigé par : BREJON-TEITLER Nadia, Orthophoniste

Résumé : La démarche de rééducation du bégaiement débute par une évaluation du trouble, qui tend à être la plus précise et exhaustive. Les outils d'évaluation actuels ne permettent pas de répondre à cette exigence clinique, c'est pourquoi l'idée de l'outil d'Evaluation du Bégaiement Ressenti et Apparent chez l'Adulte (ou EBRAA) est née. Notre étude vise à poursuivre les travaux déjà établis concernant le volet d'évaluation du bégaiement apparent. Jacquier (2015) et Fichet (2016) ont montré que l'outil présentait de bonnes fiabilités intra-juge et inter-juges, ainsi qu'une adéquation à la pratique clinique. Ce travail de recherche consiste à évaluer la sensibilité de l'outil d'évaluation du bégaiement apparent. Nous avons filmé 29 sujets avec et sans bégaiement, et soumis le protocole à 33 orthophonistes après une distribution randomisée des vidéos. Nous avons réceptionné 158 résultats. Les données recueillies nous ont permis de ranger les sujets dans différents groupes de sévérité du bégaiement. Nous avons ensuite discriminé les degrés de sévérité grâce aux scores. Enfin, nous avons élaboré des intervalles numériques déterminant les classes de sévérité du bégaiement apparent s'inscrivant dans le continuum de la fluence. Ces intervalles permettront aux orthophonistes qui utiliseront cet outil d'estimer facilement et de façon fiable la classe de sévérité du bégaiement apparent du patient.

Contact mail : [louise.autran@gmail.com](mailto:louise.autran@gmail.com)

**CHRUN Laurène et CLARET Manon (Paris)**

Programme d'exportation des techniques acquises en orthophonie dans le quotidien des adolescents qui bégaien.

Dirigé par : OKSENBERG Patricia, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la fluence qui affecte la communication, provoquant des limitations dans la vie des personnes qui en souffrent. L'exportation des techniques acquises en orthophonie est donc cruciale. L'adolescence, étape déterminante de la construction personnelle, majore les impacts du bégaiement.

Notre objectif est d'analyser l'effet de l'intégration d'un entraînement à visée écologique dans des lieux du quotidien, associé à la rééducation habituelle, chez des adolescents francophones qui bégaient. Huit adolescents de 11 à 16 ans, présentant un bégaiement, ont été répartis équitablement entre un groupe ayant bénéficié de sessions extérieures, parallèlement à la thérapie, et un groupe ayant poursuivi la thérapie uniquement.

Avant et après ce protocole, chacun des participants a été soumis à la même évaluation : un questionnaire d'évaluation des restrictions dues au bégaiement en vie quotidienne, l'OASES-T section qualité de vie, puis les épreuves langagières du nombre de mots bégayés, section description d'images sur support. Les participants ayant bénéficié des sessions à visée écologique, associées à la rééducation, ont connu une meilleure diminution des restrictions en vie quotidienne et une meilleure amélioration de leur qualité de vie, par rapport aux autres participants. Aucun effet sur la fluence n'a pu être mis en évidence. Cette étude corrobore donc les recherches antérieures. Elle constitue une perspective encourageante concernant l'ajout d'éléments écologiques à la rééducation orthophonique, en vue d'améliorer la vie quotidienne des patients qui bégaien.

Contact mail : [laurene.chrun@gmail.com // manon.clrt@gmail.com](mailto:laurene.chrun@gmail.com // manon.clrt@gmail.com)

**DUREUX Nina (Lyon)**

Proposition d'outil diagnostique : la Batterie d'évaluation du bredouillement chez l'enfant âgé de 8 à 11 ans

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Dirigé par : DESPORTES Émilie, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'université

Résumé : Le bredouillement est un trouble de la fluence de la parole sur lequel des recherches scientifiques sont menées depuis une dizaine d'années seulement. Il est souvent confondu avec le bégaiement qui a déjà été très étudié, mais diffère dans ses manifestations et dans sa prise en soin orthophonique.

Le manque de connaissances du grand public et des orthophonistes à propos de ce trouble explique le constat suivant : le bredouillement est sous-diagnostiqué. Pour autant, il constitue chez les personnes qui bredouillent un handicap au quotidien. Leur intelligibilité est réduite à cause d'un débit de parole trop rapide ou irrégulier et à une coarticulation excessive. En 2014, un outil diagnostique a donc été développé chez l'adulte par Desportes et Meyer : la Batterie d'évaluation du bredouillement (18-60 ans). La présente étude vise à adapter cet outil chez l'enfant.

En effet, il s'avère nécessaire de poser un diagnostic le plus précoce possible en vue d'assurer un accompagnement orthophonique adapté au patient. Ainsi, l'outil développé au cours de ce mémoire est la Batterie d'évaluation du bredouillement (8-11 ans). Un groupe de 30 enfants tout-venant a permis d'établir une norme à l'issue des passations de la batterie. Les performances à ces mêmes épreuves de six enfants qui bredouillent ont ensuite été comparées à la norme. Les résultats montrent que ce nouvel outil permet de mettre en évidence chez les enfants qui bredouillent par rapport aux enfants tout-venant : un débit articulatoire trop rapide ou irrégulier, une coarticulation excessive, une fréquence anormalement élevée de disfluences « normales », de télescopages, d'erreurs syntaxiques ainsi qu'un déficit d'encodage phonologique.

Contact mail : [nina.dureux@icloud.com](mailto:nina.dureux@icloud.com)

**JUNOD KRIEGER Guillemette (Amiens)**

Comparaison des tempéraments parmi une population francophone d'enfants bégues et fluents d'âge préscolaire.

Dirigé par : AUNIS OUMGHAR Clément, Orthophoniste, Chargé d'enseignement à l'Université, Responsable de l'UE bégaiement au DUEFO d'Amiens

Résumé : L'objectif de ce mémoire est donc d'étudier les caractéristiques du tempérament de 30 enfants français d'âge préscolaire (3;0-6;11 ans) qui bégaien, comparativement à 31 enfants fluents du même âge, en utilisant la version très courte du Children's Behavior Questionnaire (Putnam et Rothbart, 2006), questionnaire parental issu de la théorie psychobiologique de Rothbart et al. (2001). Cet outil validé pour les enfants de 3 à 8 ans permet d'appréhender leur tempérament sous l'angle des trois grandes dimensions constitutives du tempérament : le dynamisme ou extraversion, les affects négatifs et le contrôle volontaire.

Contact mail : [guilljunod@hotmail.com](mailto:guilljunod@hotmail.com)

**VALLE Anaïs (Nancy)**

Étude des disfluences : caractéristiques articulatoires du bégaiement.

Dirigé par : HIRSCH Fabrice, Chercheur.

Résumé : NC.

Contact mail : [valle.anais8@gmail.com](mailto:valle.anais8@gmail.com)

**VILLAGEOIS Roxanne (Lille)**

Le bredouillement : Critères et Outils Diagnostiques.

Dirigé par : GODFRAIN Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : Ce mémoire est une revue de littérature abordant un trouble de la fluence méconnu : le bredouillement. Cette revue définira ce trouble en précisant clairement ses nombreux critères diagnostiques et nous présenterons la plupart des outils diagnostiques et d'évaluation disponibles. Cela, pour aider et orienter l'orthophoniste dans

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

son diagnostic. Ce dernier, de par le manque d'outils et les nombreuses définitions du bégaiissement, peut se sentir perdu face au patient qui bégaiille, ne sachant précisément quels domaines évaluer ou quels outils utiliser. Ce mémoire répondra, nous l'espérons, à cette problématique. La méthodologie consiste en une recherche systématique de la littérature sur les bases de données scientifiques. Les études comprenant des patients avec déficits sensoriels, neurologiques, intellectuels ou cognitifs sévères ont été exclues. Nous avons retenu 50 études. Qu'est-ce que le bégaiissement ?

C'est un trouble de la fluence caractérisé par une parole avec un débit trop rapide et/ou irrégulier, des pauses anormales, des disfluences « normales » excessives ; des télescopages, des diminutions ou suppressions de syllabes et un rythme anormal. À ce jour, les outils diagnostiques et d'évaluation disponibles sont peu nombreux. Certains contribuent au diagnostic en vérifiant la présence de critères diagnostiques ou permettent l'exclusion de diagnostics différentiels, d'autres permettent au praticien d'évaluer sa pratique et les progrès du patient. Ces outils ne sont pas tous spécifiques du bégaiissement mais ont leur utilité et seront pour la plupart présentés dans ce mémoire.

Mots-clés : *Bégaiissement - Critères diagnostiques - Outils diagnostiques - Tests.*

Contact mail : [roxy97240@gmail.com](mailto:roxy97240@gmail.com)

**VINCENT Daphnée (Nantes)**

Le bégaiement associé à un retard de parole et/ou de langage : traduction du Speech Motor Assessment Scale (SMAS) et données préliminaires sur un échantillon de sujets contrôles et un échantillon de sujets pathologiques.

Dirigé par : MILCENT Marie-Noëlle, Orthophoniste ; BOUTON-KELLY Ludivine, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université

Résumé : Le bégaiement s'accompagne souvent d'un retard de parole et/ou de langage. Des études américaines ont mis en évidence qu'un tiers des enfants qui bégaiencent souffrent de troubles langagiers, voire même 60 % d'entre eux (Arndt & Healey, 2001 ; Blood & al., 2003). La concomitance de ces troubles relèvent d'une évaluation et d'une prise en charge particulières. L'échelle SMAS (Riley & Riley, 1985) a pour but de quantifier la sévérité de la discoordination motrice de la parole auprès d'enfants âgés de 4 à 11 ans présentant un bégaiement qui s'accompagne ou non d'un trouble langagier. A ce jour, il n'existe pas d'échelle d'évaluation valide en Français permettant d'évaluer spécifiquement cette modalité au sein de ces atteintes. Le but de cette étude est de traduire et d'adapter l'échelle SMAS à la langue française et d'obtenir des données préliminaires auprès d'une population d'enfants contrôles et d'une population pathologique afin de comparer nos résultats aux données de la littérature.

Contact mail : [vincent.daphnee44@gmail.com](mailto:vincent.daphnee44@gmail.com)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## Année 2018 – 2019

### **BILLON Laura (Amiens)**

Création d'outils vidéo pour des adolescents avec bégaiement bénéficiant du Programme Camperdown.

Dirigé par : MARION Sophie, Orthophoniste.

Résumé : NC

Contact mail : [laura.1607@hotmail.fr](mailto:laura.1607@hotmail.fr)

### **BRESSAC Claire, MORIN Laura (Tours)**

Évaluation du bégaiement chez l'enfant d'âge scolaire : apport de l'échelle IADBE.

Dirigé par : COCHEREAU Audrey, Orthophoniste ; BOUCARD Caroline, Orthophoniste.

Résumé : À l'âge scolaire, le bégaiement est souvent chronicisé. Les comportements bégues s'automatisent et deviennent plus difficiles à modifier. Ainsi, une prise en charge basée uniquement sur un accompagnement parental n'est plus suffisante. Il devient alors nécessaire d'engager un partenariat avec l'enfant lui-même, qui doit devenir acteur de la prise en charge. À cet âge, les enfants ont en grande majorité conscience de bégayer. Toutefois, l'enfant d'âge scolaire qui bégaye ne parvient pas toujours à exprimer sa gêne dans le quotidien.

Peu d'outils d'évaluation existent pour aider l'enfant à exprimer cette gêne. C'est pourquoi l'échelle Illustrée d'Auto-évaluation des Difficultés liées au Bégaiement chez l'Enfant d'âge scolaire (IADBE) a été créée par Boucard et Cochereau (2017). Cette échelle est basée sur des illustrations représentant des situations de la vie quotidienne que l'enfant doit trier pour l'aider à déterminer quelles situations sont difficiles pour lui. L'échelle IADBE peut-elle alors participer à l'expression des difficultés liées au bégaiement chez l'enfant d'âge scolaire ? Pour le savoir, nous avons comparé les résultats de l'échelle IADBE à ceux d'un questionnaire oral (Aumont-Boucand, 2009).

Nos résultats bruts montrent que l'échelle IADBE permet de soulever plus de situations difficiles que le questionnaire. Toutefois, les résultats statistiques indiquent que le pourcentage moyen de situations difficiles au questionnaire est significativement supérieur au pourcentage moyen de situations difficiles évoquées à l'échelle IADBE. Par ailleurs, les retours des orthophonistes sollicitées ainsi que nos observations lors des passations nous ont permis de constater que l'échelle IADBE apporte des éléments sur le plan qualitatif.

Contact mail : [bressac.claire@gmail.com // morin.laura24@gmail.com](mailto:bressac.claire@gmail.com // morin.laura24@gmail.com)

### **CHANTREL Margot (Nice)**

Évolution de l'estime de soi chez les enfants qui bégaien d'âge scolaire, dans le cadre d'une prise en charge orthophonique.

Dirigé par : AGULLO Lucie, Orthophoniste.

Résumé : Évaluer l'impact de la prise en charge orthophonique sur l'estime de soi chez l'enfant qui bégaye. Avec un questionnaire d'estime de soi nous avons analysé les scores en deux temps, partant du postulat que la rééducation du bégaiement améliorerait l'estime de soi, affect assez impacté dans ce trouble.

Contact mail : [chantrelmargot@gmail.com](mailto:chantrelmargot@gmail.com)

### **DELFOUR Cécilia (Limoges)**

Évaluation d'un protocole de pleine conscience dans la prise en soin individuelle d'enfants atteints de bégaiement - Étude de cas.

Dirigé par : RAVIDAT Evelyne, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Résumé : Au-delà des disfluences, le bégaiement engendre des émotions négatives et une anxiété à l'idée de communiquer, une altération de la confiance en soi, une anxiété d'anticipation, des conduites d'évitement. Nous observons alors une diminution de la qualité de vie, notamment en rapport avec le fonctionnement émotionnel. La peur, le déni et la crainte des sensations mêmes procurées par le bégaiement jouent également un rôle. La pression temporelle y occupe une place particulièrement importante, entravant ainsi considérablement le désir de communiquer.

Dans ce contexte, les auteurs nous invitent à la prudence quant aux méthodes de rééducation : utilisés seuls, les exercices de fluence ne recouvrent pas les aspects émotionnels du bégaiement. De plus, le risque d'un accompagnement uniquement technique risque d'engendrer chez le patient un hypercontrôle contreproductif, installant une conduite nocive de lutte. Deux axes de prise en charge sont alors à considérer en orthophonie : d'un côté l'aspect technique et instrumental, de l'autre un travail sur l'acceptation du trouble et la gestion des émotions.

La méditation de pleine conscience (ou mindfulness), introduite à l'hôpital dans les années 1980, s'inscrit dans ce deuxième axe de prise en charge. Ses bénéfices largement reconnus sur l'acceptation du trouble, l'estime de soi ou encore sur les capacités attentionnelles font d'elle une méthode de plus en plus utilisée par les orthophonistes, notamment dans la prise en charge du bégaiement. L'objectif de ce mémoire est d'évaluer, à travers une étude de cas, les effets d'un cycle de pleine conscience sur le bégaiement de l'enfant, de façon directe (disfluences, regard etc.) et indirecte (vécu du trouble, gestion des émotions, etc.). Le protocole "Calme et attentif comme une grenouille" (Eline Snel, 2010) est utilisé comme base de notre travail, grâce à des séances audio de méditation guidées.

Contact mail : [cecilia.delfour@gmail.com](mailto:cecilia.delfour@gmail.com)

**DELORME Anne-Claire (Tours)**

Prise en charge du bégaiement avec le Programme Camperdown : quels changements dans la pratique orthophonique ?

Dirigé par : KERBRAT Fanny, Orthophoniste

Résumé : Quels sont les principaux changements qu'implique le programme Camperdown dans la prise en charge du bégaiement chez l'adulte et l'adolescent ?

Contact mail : [ac.delorme.ortho@gmail.com](mailto:ac.delorme.ortho@gmail.com)

**LAMBOROT Julienne et ROBIN Anaïs (Marseille)**

Prise en charge du bégaiement chez l'adulte : élaboration d'une plaquette d'information à destination des médecins généralistes.

Dirigé par : DUMAS Marie-Ève, Orthophoniste ; CHEREL Christine, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement apparaît généralement pendant l'enfance, et disparaît spontanément avant l'adolescence dans les trois quarts des cas. Il arrive cependant qu'il subsiste à l'âge adulte : on parle alors de bégaiement persistant, un trouble qui concerne 1% de la population générale. Le bégaiement est un trouble assez stigmatisé, d'autant plus dans notre société d'hyper-communication.

Le développement des médias et des moyens de communication permet néanmoins une meilleure connaissance du trouble, conduisant à une meilleure acceptation de celui-ci par la population. Certaines personnes qui bégaiètent ont appris à maîtriser leur bégaiement, d'autres parviennent peu à peu à l'accepter. Cependant, nombreux sont les adultes qui, loin de le contrôler ou de l'accepter, continuent à se battre quotidiennement contre leur bégaiement, engendrant une souffrance. Dans son rôle de dépistage, de prévention et de coordination des soins, le médecin généraliste tient une place primordiale dans la prise en charge du bégaiement de l'adulte.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Par la diffusion d'un questionnaire auprès de 52 médecins généralistes français, nous avons cependant pu constater qu'ils étaient peu informés sur le bégaiement et sa prise en charge, et qu'ils n'abordent pas toujours le sujet du bégaiement au cours de la consultation. L'objectif de notre travail était d'élaborer une plaquette d'information pour sensibiliser les médecins généralistes à la prise en charge du bégaiement persistant de l'adulte, afin de permettre un accompagnement optimal des patients et de renforcer la coordination médico-orthophonique. Cette plaquette se présente sous la forme d'un guide pratique afin d'apporter des réponses concrètes aux médecins généralistes. Nous y avons intégré un état des lieux des thérapies actuelles et de leur efficacité ainsi que des adresses et liens utiles pour qu'ils puissent soutenir leurs patients dans leur démarche de soin.

Contact mail : [jlamborot.arobin@gmail.com](mailto:jlamborot.arobin@gmail.com)

**RIGAUD Cécile (Montpellier)**

Recherche d'une éventuelle atteinte des fonctions exécutives chez les personnes qui bégaiellent.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste ; PENDELIAU Marine, Orthophoniste.

Résumé : NC

Contact mail : [rigaud.ccile@gmail.com](mailto:rigaud.ccile@gmail.com)

**SACCON Morgane (Montpellier)**

Apport de la sophrologie en parallèle d'une prise en soin orthophonique de l'adolescent qui bégaiet.

Dirigé par : BOISSEZON Laure, Orthophoniste et Sophrologue ; BRU Jacqueline, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Le bégaiement est par définition un trouble fluctuant. En ce sens, certains thérapeutes peuvent parfois se sentir déroutés face à ce trouble complexe. Au vu de la diversité des approches thérapeutiques existantes, les orthophonistes peuvent adapter au mieux leurs rééducations selon leurs patients. Néanmoins, ces approches auront un objectif commun : celui de libérer la parole et le locuteur qui bégaiet. Ainsi, les thérapies constituent des moyens et non une fin (Estienne & Bijleveld & Van Hout, 2015). Comme nous l'expliquerons dans la revue de littérature, le bégaiement développemental de l'adolescent n'est plus transitoire mais bien persistant. Or, dans les faits, on constate souvent une lassitude voire un désengagement chez les adolescents devant une prise en charge orthophonique au long cours. Nous nous sommes alors interrogés sur la place que l'on pouvait donner aux thérapies alternatives dans ce genre de situation.

Notre étude porte sur l'intérêt que représente la sophrologie en complément d'une prise en charge orthophonique chez les adolescents concernés par un bégaiement développemental à fort risque persistant. Ainsi, nous avons proposé à un groupe d'adolescents de participer à des séances de sophrologie en parallèle de leur rééducation orthophonique afin d'évaluer l'évolution de leur bégaiement, à la fois quantitativement et qualitativement, entre deux moments. Nous avons comparé cette évolution à celle d'un autre groupe d'adolescents qui bénéficiait exclusivement d'une prise en charge orthophonique. Entre les évaluations initiale et finale, chaque adolescent a participé à cinq séances d'orthophonie et seuls les adolescents du groupe expérimental ont participé à cinq séances individuelles de sophrologie, alternant systématiquement entre une séance d'orthophonie et une séance de sophrologie.

Les outils d'évaluation choisis et présentés dans notre mémoire nous ont permis de montrer une tendance à l'amélioration à la fois quantitative –avec une réduction de la sévérité du bégaiement et des comportements accompagnateurs– et qualitative –avec une diminution de l'impact du handicap du bégaiement et une augmentation de la conscience et de la maîtrise des tensions, des perceptions, du geste respiratoire et de la

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

parole— plus marquée chez les adolescents ayant bénéficié de séances de sophrologie. Cependant, au vu des biais inhérents à notre méthodologie et notamment la taille réduite de notre échantillon, il est nécessaire de se saisir de ces résultats avec précaution.

Contact mail : [morgane.saccon@gmail.com](mailto:morgane.saccon@gmail.com)

**SOLLIEC Coralie (Lille)**

État des lieux de la représentation du bégaiement en classes élémentaires : élaboration d'un support d'information.

Dirigé par : MIESZANIEC Anne-Charlotte, Orthophoniste et Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Le bégaiement touche 1% de la population, enfants comme adultes. Il est défini comme un trouble de la communication affectant la fluence de la parole. Cette dernière est entrecoupée de répétitions (de sons, de syllabes, de mots ou de segments de phrases), de pauses inappropriées ou encore de blocages. Généralement, le bégaiement apparaît lors de l'acquisition du langage. Chez certains enfants, il disparaît naturellement alors que chez d'autres, il s'installe et perdure. A l'école, entouré de ses semblables, l'enfant qui bégaye doit parfois faire face aux moqueries de la part de ses camarades. Les élèves scolarisés en classes élémentaires ne semblent pas suffisamment informés sur ce trouble.

L'ambition de ce mémoire était de concevoir un support d'information ludique expliquant le bégaiement à des élèves scolarisés du CP au CM2. Quatre-vingt-onze enfants de deux écoles de Loire-Atlantique, âgés de 6 à 11 ans, ont participé à une étude préliminaire. Cette dernière consistait en la réalisation d'entretiens individuels afin de dresser un état des lieux de leur connaissance sur le bégaiement. L'imprécision des savoirs sur ce trouble était au premier plan. Un support d'information, envisagé sous la forme d'une infographie a été créé sur la base des résultats obtenus aux entretiens. L'outil, d'une page, définit le bégaiement et ses causes, mentionne le rôle de l'orthophoniste, expose les manifestations audibles et visibles et propose un comportement adéquat à adopter face à une personne qui bégaye. Dans une perspective d'amélioration, il serait intéressant de recueillir l'avis de personnes qui bégaien, concernant ce support.

Contact mail : [coralie.solliec@wanadoo.fr](mailto:coralie.solliec@wanadoo.fr)

**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2017 – 2018**

**BELLIER Justine (Montpellier)**

Étude des disfluences : caractéristiques et rôle dans la prosodie et le développement syntaxique des enfants bégues et normo-fluents.

Dirigé par : DODANE Christelle, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université, Maître de conférence en linguistique ; BRU Jacqueline, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : NC.

Contact mail : [justine.bellier@hotmail.fr](mailto:justine.bellier@hotmail.fr) .

**BRUNEAU-HEUDES Alix (Limoges)**

Prise en charge orthophonique du bégaiement neurodéveloppemental : Evaluation des pratiques professionnelles lors du bilan.

Dirigé par : TOURNIER-BADRE Christine, Orthophoniste.

Résumé : Grâce à un questionnaire, j'essaie de dresser un portrait le plus exhaustif possible des pratiques actuelles des orthophonistes dans le bilan du bégaiement neuro-développemental.

Contact mail : [alixbrunneauheudes@gmail.com](mailto:alixbrunneauheudes@gmail.com)

**BURKHARDT Eléonor (Tours)**

Étude des phénomènes de liaison et d'enchaînement chez des locuteurs adultes bégues et normofluents.

Dirigé par : BREJON Nadia, Orthophoniste ; BOREL Stéphanie, Orthophoniste

Résumé : NC.

Contact mail : [eleonor.burkhardt@gmail.com](mailto:eleonor.burkhardt@gmail.com)

**CHAVOT Théa et PIQUET-GAUTHIER Sibylle (Paris)**

Efficacité du programme Lidcombe en téléorthophonie : étude comparative de rééducations en présentiel et à distance.

Dirigé par : AUMONT-BOUCAND Véronique, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Actuellement, la pratique de la téléorthophonie est au cœur des préoccupations en France. En parallèle, le programme Lidcombe, traitement du bégaiement de l'enfant d'âge préscolaire, ne cesse de démontrer son efficacité. L'objectif principal de cette étude est de prouver la viabilité d'une prise en charge à l'aide de cette méthode appliquée de manière expérimentale, via webcam.

Les objectifs secondaires sont de faire un état des lieux de la téléorthophonie sur notre territoire, ainsi que de soutenir le traitement par la création d'un outil vidéo. Notre étude thérapeutique rétrospective et non paramétrique consistait à comparer deux cohortes ayant bénéficié du programme Lidcombe, l'une en présentiel et l'autre à distance. Les huit sujets répartis équitablement devaient avoir entre trois et six ans au début de la prise en charge, avec un bégaiement persistant depuis plus de six mois. Notre critère d'évaluation principal a été le nombre de semaines, ainsi que de séances d'orthophonie durant le stade 1.

Malgré un manque de significativité au vu du nombre restreint de sujets, nous avons pu confirmer que le programme Lidcombe délivré via Skype ou en présentiel présente des résultats quasi équivalents. L'efficacité de la modalité à distance a particulièrement été prouvée par le nombre restreint de séances nécessaires. Il apparaît donc que, délivré à distance, le programme Lidcombe est presque aussi efficace qu'en présentiel. La pratique de la téléorthophonie pourrait ainsi s'avérer être une solution viable, et mèreraient d'être légalisée en France.

Contact mail : [memoire.ortho.begaiement@gmail.com](mailto:memoire.ortho.begaiement@gmail.com)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**COUSINET Alice (Nantes)**

Exploration des capacités phonologiques chez des enfants âgés de 5 à 8 ans suivant une prise en charge pour bégaiement.

Dirigé par : MILCENT Marie-Noëlle, Orthophoniste ; BOUCHER Gwenola, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Les capacités phonologiques chez des enfants qui bégaient sont-elles déficitaires ? Les liens entre les capacités phonologiques et le bégaiement sont encore flous même si de nombreuses études tendent à mettre en évidence une possible corrélation. En étudiant les capacités phonologiques d'une vingtaine d'enfants suivis pour bégaiement, à travers les épreuves phonologiques du test Exalang, nous allons essayer de déterminer si certains participants auraient possiblement un trouble phonologique associé. De plus, grâce à une analyse statistique, nous allons essayer de déterminer si les résultats des enfants qui bégaient sont différents de la norme.

Contact mail : [alice.cousinet@gmail.com](mailto:alice.cousinet@gmail.com)

**DAVIAUD Pauline (Montpellier)**

Étude qualitative interrogeant les parents participant au programme Lidcombe en France. Dirigé par : PENDELIAU Marine, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; BRU Jacqueline, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : C'est une étude sur l'expérience et le vécu des parents participant ou ayant participé au programme Lidcombe en France. Grâce à un questionnaire, nous allons objectiver leur expérience parentale (les bénéfices, les difficultés rencontrées etc), leur perception de cette méthode ainsi que leur ressenti au cours de son application.

Contact mail : [pauline.daviaud@yahoo.fr](mailto:pauline.daviaud@yahoo.fr)

**DELORME Anne-Claire (Tours)**

Élaboration d'un questionnaire sur les premiers retours du programme Camperdown en France.

Dirigé par : KERBRAT Fanny, Orthophoniste.

Résumé : Qu'en est-il du programme Camperdown en France ?

Contact mail : [ac.delorme.ortho@gmail.com](mailto:ac.delorme.ortho@gmail.com)

**PAROLINI Marie et VILLOING Anaïs (Paris)**

Impact de la complexité syntaxique sur la fluence en production dans le bégaiement adulte. Dirigé par : GATIGNOL Peggy, Orthophoniste, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université ; PIERART Bernadette, Orthophoniste, Chercheuse, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : NC.

Contact mail : [marie.parolini@gmail.com](mailto:marie.parolini@gmail.com)

**PEIGAT Marie (Limoges)**

Motricité et tension manuelle dans le bégaiement : Revue systématique de la littérature. Dirigé par : BOISSEZON Laure, Orthophoniste.

Résumé : En nous appuyant sur les données existantes dans la littérature scientifique ainsi que la pratique orthophonique, nous nous sommes demandé si le lien entre la main et la sphère oro-laryngée était également présent dans le bégaiement. L'objectif de cette étude était de réaliser une revue systématique de la littérature sur les liens entre bégaiement et motricité ou tensions manuelles. La revue systématique a été réalisée selon les critères du guide PRISMA.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Les titres et résumés des articles identifiés sur la multibase Summon ont été sélectionnés selon nos critères d'inclusion. Le texte intégral des articles éligibles a ensuite été analysé. 2 articles cités dans les sources des études incluses ont été ajoutés à l'analyse. 217 articles ont été référencés. 50 étaient éligibles. 24 ont finalement été inclus dans la revue systématique : 21 études cas-témoins, 2 études de cohorte et une étude de cas. Malgré l'hétérogénéité des méthodologies et résultats, certains aspects de la motricité manuelle semblent impactés dans le bégaiement. Aucune étude ne nous a permis de conclure sur la présence de tensions manuelles. D'autre part, l'action manuelle aurait un impact positif sur le bégaiement. Enfin, aucun résultat ne nous a permis de nous prononcer sur l'impact d'une action ciblant les tensions manuelles sur le bégaiement et les tensions orolaryngées. Ces résultats sont à relativiser et les recherches sont à poursuivre dans ce domaine afin d'améliorer la connaissance du bégaiement et donc l'accompagnement des personnes en souffrant.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

**RICCI Clara (Lyon)**

Apports de la méditation de pleine conscience dans la prise en soin de l'enfant qui bégaye : Elaboration d'un support d'information à destination des orthophonistes et étudiants en orthophonie.

Dirigé par : DE CHASSEY Juliette, Orthophoniste ; JURY Maryline, Instructrice MBSR pour enfants.

Résumé : La parution récente d'ouvrages abordant la méditation de pleine conscience pour les enfants pourrait indiquer la possibilité d'utilisation de cette pratique avec un public très varié. Cette pratique issue des traditions contemplatives, notamment bouddhistes, entièrement laïcisée, a été introduite en milieu hospitalier dans les années 1980.

Elle est considérée aujourd'hui comme une thérapie de troisième génération, et semble trouver toute sa place dans la rééducation orthophonique du bégaiement. Afin d'en définir les bénéfices pour l'enfant qui bégaye, nous avons réalisé une revue de littérature abordant les différents aspects sur lesquels la méditation de pleine conscience aurait un rôle à jouer.

Pour définir l'intérêt que pourraient porter orthophonistes et étudiants à cette pratique en tant qu'outil thérapeutique, nous avons effectué une enquête grâce à un questionnaire. Il est ressorti de cette enquête un intérêt certain des participants pour cette pratique et pour un support visant à diffuser des informations à ce sujet. Ainsi, nous avons réalisé, dans le cadre du présent mémoire, une plaquette d'information destinée aux orthophonistes et aux étudiants. Proposant une bibliographie, elle détaille ce qu'est la méditation de pleine conscience, son intérêt pour l'enfant qui bégaye, et fournit des exemples d'exercices pratiques.

Contact mail : [memoire.ricci@gmail.com](mailto:memoire.ricci@gmail.com) .

**ROBITAILLE Caroline (Nice)**

Méthodologie et étude de la faisabilité pour le développement d'un jeu permettant la rééducation des habiletés de communication chez les enfants d'âge scolaire présentant un bégaiement.

Dirigé par : GRAND Marie-Laure, Orthophoniste ; ZANGHELLINI Gilbert, Orthophoniste Résumé : NC.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

**ROUSSEAU Léa (Paris)**

L'impact du bégaiement sur la qualité de vie des adolescents.

Dirigé par : OKSENBERG Patricia, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [rousseau\\_lea@hotmail.fr](mailto:rousseau_lea@hotmail.fr)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## Année 2015 – 2016

### **ALLARD Elise et QUENTIN Christel (Nantes)**

Le discours des adultes qui bégaient sur la rechute, ou comment ce discours s'inscrit dans le processus de sortie du bégaiement.

Dirigé par : VIDAL-GIRAUD Hélène, Orthophoniste

Résumé : NC.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

### **BONAL Constance et FRAUD ALVAREZ Emma (Lyon)**

Prise en soin du bégaiement adulte : intérêts d'une stimulation par le chant thérapie orthophonique – Etude de cas multiples.

Dirigé par : BRIGNONE Sylvie, Orthophoniste ; PENDELIAU VERDURAND Marine, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement est un trouble complexe caractérisé par une perturbation de la commande motrice affectant le flux de la parole et impactant les habiletés communicationnelles. Diverses études ont montré l'efficacité des Thérapies Comportementales et Cognitives, dont les objectifs sont de réduire les disfluences et de diminuer les souffrances psychologiques liées au bégaiement. Actuellement, les spécificités neuroanatomiques, révélées par l'Imagerie par Résonance Magnétique, nous informent sur l'utilisation préférentielle de l'hémisphère droit par la personne qui bégaye lorsqu'elle parle. Face à ces nouvelles données, nous nous sommes interrogées sur l'intérêt d'une stimulation par le chant dans la prise en soin du bégaiement adulte.

En effet, la voix chantée active davantage l'hémisphère droit que la voix parlée. Pour ce faire, nous avons défini trois domaines dans lesquels l'adulte qui bégaye se voit entravé : la fluence en discours spontané, la fluence en lecture et les habiletés communicationnelles. Ainsi, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle le chant permettrait une amélioration significativement plus rapide de la fluence et des habiletés verbales et sociales chez l'adulte qui bégaye. Nous avons réalisé une étude de cas multiples pour laquelle nous avons comparé trois patients suivis en thérapie avec chant à trois patients suivis en thérapie sans chant. L'étude montre, pour 2 binômes sur 3, une amélioration significative des habiletés verbales et sociales des patients ayant suivi une thérapie chantée.

En revanche, aucune différence significative n'a été montrée concernant l'impact du chant sur les disfluences. Nous retenons le facteur temps comme biais principal, permettant d'expliquer la non-significativité de certains résultats. A l'évidence, il serait pertinent de mener une étude complémentaire en ce sens.

Contact mail : [constancebonal@hotmail.fr](mailto:constancebonal@hotmail.fr) // [emmafraudalvarez@hotmail.fr](mailto:emmafraudalvarez@hotmail.fr)

### **FICHET Marion (Tours)**

Élaboration d'un outil d'évaluation des aspects visibles du bégaiement de l'adulte, deuxième version.

Dirigé par : BREJON-TEITLER Nadia, Orthophoniste.

Résumé : Pathologie complexe dans son abord, le bégaiement affecte d'une part le ressenti de l'individu et d'autre part les aspects visibles et audibles de la parole. Concernant à la fois les enfants et les adultes, sa prise en charge orthophonique nécessite un bilan complet et précis. Toutefois, en France, il existe peu d'outils répondant à ces critères, notamment dans l'évaluation du bégaiement chez l'adulte. Face à ce constat, nous proposons dans cette étude une révision d'un outil élaboré initialement par Jacquier (2015).

Ce dernier vise à évaluer les aspects visibles et audibles du bégaiement chez l'adulte. La fiabilité interjuges s'était révélée insuffisante dans la première version ; nous nous appuyons donc sur un nouvel éclairage de la littérature afin d'utiliser un autre moyen d'évaluation et ainsi tâcher d'éviter les écueils précédemment rencontrés. Après

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

avoir élaboré cette deuxième version, nous soumettons son utilisation à des orthophonistes exerçant en libéral. Ayant à leur disposition la vidéo d'un patient adulte, présentant un bégaiement, en situation de langage spontané, les thérapeutes cotent ses difficultés grâce à la feuille de passation de notre outil. Nous leur proposons également d'apporter leurs commentaires et remarques. Nous émettons l'hypothèse que notre outil est fidèle.

Pour cela, deux phases distinctes se déroulant à au moins trois semaines d'intervalle sont nécessaires. Les résultats obtenus indiquent à la fois des fiabilités inter-juges et intra-juge correctes, permettant de conclure à une bonne fidélité. Les avis recueillis permettront d'apporter quelques modifications à notre outil, dans une perspective d'étalonnage.

Contact mail : [marionfichet92@gmail.com](mailto:marionfichet92@gmail.com)

**GALLAND Marie et GRAINVILLE Juliette (Lyon)**

Le bégaiement et ses conséquences sur les interactions.

Dirigé par : ALLAIGRE Bruno, Chargé d'enseignement à l'Université, Sociologue, Psychanalyste.

Résumé : Cette recherche a pour but de rendre compte de l'impact du stigmate « bégaiement » sur les interactions sociales des personnes qui bégaien, en se basant sur le courant interactionniste. Pour la mener à bien, quatorze entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d'adultes qui bégaien. L'analyse de ces entretiens a montré que le bégaiement a des conséquences chez tous les adultes qui bégaien, mais de façon plus ou moins importante. En effet, le bégaiement engendre la naissance d'une identité bégue qui entre parfois en conflit avec l'identité personnelle. Il est alors difficile de garder la face dans l'échange pour la personne qui bégaye.

Elle peut alors vivre son bégaiement comme un handicap, mais de manière situationnelle. Au cours de sa trajectoire biographique, son regard sur le bégaiement change, ce qui engendre une évolution du ressenti du bégaiement. Celui-ci fluctue également en fonction de la posture de l'interlocuteur qui peut, à travers ses réactions, mettre à mal l'interaction. De plus, le bégaiement a un impact dans l'investissement et le plaisir dans la communication, ce qui limite parfois les interactions avec leur environnement. Enfin, l'interaction est non seulement perturbée du côté de la personne qui bégaye, mais aussi du côté de son interlocuteur. Et cela a pu être vérifié grâce aux entretiens durant lesquels l'échange a été parfois perturbé. Une étude similaire dans une dizaine d'années pour permettre de voir l'évolution du tabou qui réside autour de ce trouble.

Contact mail : [marie-galland@wanadoo.fr](mailto:marie-galland@wanadoo.fr) // [juliette.grainville@gmail.com](mailto:juliette.grainville@gmail.com)

**JOUBERTON Amy (Bordeaux)**

Création et évaluation d'une application mobile à destination des personnes qui bégaien. Dirigé par : TRESSENS Laure, Orthophoniste.

Résumé : L'objectif du mémoire est de créer une application mobile permettant l'auto-évaluation du bégaiement, et de la soumettre à 30 patients afin de récolter leurs avis et critiques. Suite à ces retours, l'application sera modifiée pour correspondre au mieux aux attentes des personnes qui bégaien.

Contact mail : [amy.jouberton.ortho@gmail.com](mailto:amy.jouberton.ortho@gmail.com)

**LEPAIN Bérangère (Tours)**

Élaboration d'un outil d'évaluation du ressenti du bégaiement chez l'adulte – 2ème version. Dirigé par : BREJON-LAMARTINIERE Nadia, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la parole et de la communication qui questionne encore aujourd'hui. Lors d'une prise en charge orthophonique, il est nécessaire d'orienter le suivi grâce à une évaluation des troubles du patient. Les signes visibles et audibles du bégaiement sont facilement détectables mais il est nécessaire d'approfondir le questionnement avec le patient afin de connaître les éléments invisibles de son trouble. Notre

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

étude est donc basée sur l'évaluation du ressenti du bégaiement chez l'adulte ; les aspects « objectifs » du bégaiement sont traités dans une étude menée parallèlement (Fichet, 2016).

Suite au travail effectué par Anne Bonnefoy-Mathieu, nous avons élaboré une deuxième version de l'outil d'évaluation du ressenti du bégaiement chez l'adulte. La plus grande modification se situe dans la création de deux outils distincts : un outil à utiliser lors du bilan initial et un autre à proposer lors du bilan de suivi. Nous avons ensuite demandé à 26 orthophonistes formées dans le domaine du bégaiement d'utiliser les outils d'évaluation auprès de leurs patients. Nous avons ainsi exploité 50 protocoles qui répondaient aux conditions de passation. Les données recueillies nous ont permis de corrélérer le score obtenu par le patient au bilan et l'impression clinique que l'orthophoniste perçoit de la sévérité du trouble. Ceci a été étudié dans le but de rendre plus objectif notre regard sur le ressenti du bégaiement.

Contact mail : [berangere.lepain@hotmail.fr](mailto:berangere.lepain@hotmail.fr)

**LOZE Camille (Lille)**

Partenariat orthophonistes/neurologues dans la prise en charge du bégaiement et des troubles de la fluence de l'adulte. Production d'un dépliant informatif à l'attention des neurologues.

Dirigé par : PERNON Michaela, Orthophoniste ; AUMONT BOUCAND Véronique, Orthophoniste.

Résumé : La recherche fondamentale récente sur le bégaiement développemental met en avant de possibles causes neurologiques, grâce à l'essor de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. De plus, le bégaiement acquis apparaît comme un trouble peu fréquent, mais présent, comme les autres troubles de la fluence, dans un grand nombre de pathologies neurologiques. Cependant, il existe peu de données concernant l'implication des neurologues dans la prise en charge des patients adultes présentant un bégaiement et/ou d'autres troubles de la fluence, développementaux ou acquis.

Dans le cadre de ce mémoire, une enquête a été réalisée auprès de 75 neurologues et de 112 orthophonistes exerçant en France. Le but principal de ce travail était d'évaluer l'éventuel besoin d'information des neurologues dans le domaine des troubles de la fluence de l'adulte. Les objectifs secondaires étaient de mieux connaître la prise en charge médicale neurologique de ces pathologies et les modalités du partenariat orthophonistes/neurologues. Une demande d'information ayant émergé des résultats de l'enquête auprès des neurologues, un dépliant informatif à leur attention a été élaboré à la suite de cette enquête. Dans ce dépliant, l'accent a été mis sur la prise en charge de ces troubles, la classification et la communication interdisciplinaire, selon les souhaits des neurologues interrogés. L'enquête a permis de montrer que les échanges entre neurologues et orthophonistes concernant les patients adultes présentant des troubles de la fluence existent, mais qu'un véritable partenariat reste à créer.

Contact mail : [camille.loze@gmail.com](mailto:camille.loze@gmail.com)

**MATHIEU Marlyse (Nancy)**

Bégaiement et troubles de l'oralité alimentaire : évaluation des liens entre ces pathologies au moyen d'un questionnaire destiné aux parents et aux enfants.

Dirigé par : ERCOLANI-BERTRAND Françoise, Orthophoniste

Résumé : NC.

Contact mail : [marlyse16@hotmail.fr](mailto:marlyse16@hotmail.fr)

**PAVERO Valérie (Nancy)**

Programme Lidcombe : adaptation et créativité des parents au travers des conversations d'entraînement.

Dirigé par : DAUBIE Catherine, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Résumé : Le bégaiement est un trouble qui peut survenir entre deux et quatre ans, quand apparaît le langage. En perturbant le rythme de la parole il altère la fluence, et de ce fait gêne la communication. La guidance parentale qui est pratiquée par la plupart des orthophonistes ne suffit pas toujours à rendre à la parole sa fluidité, et chez certains enfants le bégaiement risque de s'installer. Le Programme Lidcombe est une des réponses possibles. Cette méthode qui fait intervenir les parents a commencé à montrer des résultats intéressants. Il s'agit d'un programme de psychologie comportementale avec des renforcements positifs sur la parole fluide, d'abord au cours de conversations d'entraînement, puis de plus en plus dans le quotidien. L'objectif de ce mémoire est d'étudier la manière dont les parents mettent en place de nouvelles activités afin d'appliquer le Programme Lidcombe. Pour cela nous avons soumis un questionnaire à dix parents d'enfants qui bégaient, afin de déterminer leurs ressentis avant le début du programme, puis la façon dont ils l'ont utilisé et leur respect des contraintes induites par la structure du programme, et enfin leurs ressentis et remarques une fois le programme terminé ou en passe de l'être. Nous avons pu observer qu'en général les parents respectent les consignes données par l'orthophoniste en séance et qu'ils se basent souvent sur les activités utilisées par l'orthophoniste en séance pour trouver des jeux à pratiquer à la maison. Ce qui ressort de cette étude, plus que la créativité des parents, c'est leur maîtrise du programme, le plaisir et les bienfaits de partager un moment de jeu avec leur enfant en-dehors de toute la pression du quotidien. Mais aussi les bénéfices secondaires dans d'autres domaines que le bégaiement, qui découlent des ces moments privilégiés entre parent et enfant.

Mots-clés: *Bégaiement - Programme Lidcombe - Conversations d'entraînement - Ressentis des parents*  
Contact mail : [valerie.pavero@gmail.com](mailto:valerie.pavero@gmail.com) .

**PORTRAIS Alix (Nice)**

L'acquisition de la théorie de l'esprit chez les enfants souffrant de bégaiement.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [alix.portais@hotmail.fr](mailto:alix.portais@hotmail.fr)

**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2014 - 2015****BONNEFOY-MATHIEU Anne (Tours)**

Élaboration d'un outil d'évaluation du vécu du bégaiement chez l'adulte.

Dirigé par : BREJON-LAMARTINIERE Nadia, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement est un trouble moteur qui perturbe le flux de la parole. Il se manifeste par des bégayages et des tensions qui constituent la caractéristique la plus apparente du trouble. Seulement, le bégaiement ne se limite pas à ces aspects visibles et audibles. En effet, il affecte, de manière plus discrète, les compétences sociocommunicatives, l'état émotionnel et la qualité de vie des personnes concernées. Ce mémoire s'intéresse à cette dimension cachée du trouble et plus particulièrement à son évaluation par les orthophonistes. Nous avons étudié les outils d'évaluation mis à disposition des professionnels. Suite à nos observations, nous avons émis l'hypothèse que les orthophonistes sous-utilisent ces supports, du fait de leurs nombreuses lacunes et de leur dispersion. L'objectif de cette étude est donc d'élaborer un outil d'évaluation qualitatif et quantitatif, au caractère exhaustif, qui viendrait remédier aux lacunes présentes dans les tests actuels. En premier lieu, nous avons souhaité connaître les modes d'évaluation du bégaiement chez l'adulte au sein de la pratique orthophonique. Pour cela, nous avons réalisé une enquête auprès de cent professionnels via un questionnaire en ligne. L'analyse des réponses obtenues confirme la nécessité de créer un outil d'évaluation complet et chiffré. Suite à son élaboration, nous avons demandé à douze orthophonistes formés dans le domaine du bégaiement de l'utiliser avec leurs patients en situation d'évaluation, puis de remplir un questionnaire afin d'en commenter l'organisation et le contenu. L'analyse qualitative et quantitative des données nous a permis de dégager des pistes d'amélioration pour notre outil d'évaluation. Outre ces quelques modifications à réaliser, la majorité des orthophonistes témoigne de sa pertinence en se déclarant prêts à l'utiliser dans leur pratique.

Contact mail : [bonnefoymathieu.anne@gmail.com](mailto:bonnefoymathieu.anne@gmail.com)

**CRESTEL Gaëlle et MORELL Laurie (Toulouse)**

Intérêt d'un travail sur les émotions dans la prise en charge de groupe d'adolescents qui bégaiendent, à l'aide d'une démarche s'inspirant de l'éducation nationale.

Dirigé par : LAMBERT Juliette, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; DUC Sophie, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la communication se traduisant par des symptômes visibles et des manifestations invisibles, fortement liées aux émotions. La personne qui bégaien a tendance à mettre à distance son vécu émotionnel (Ellis, 1992), il lui est difficile de gérer ses émotions. De plus, Rustin et Khur (1992) affirment que les troubles émotionnels de la personne qui bégaien influencent les comportements de communication : ils sont un frein à l'acquisition des habiletés sociales. Notre étude s'est donc axée sur la prise en compte de l'aspect émotionnel du bégaiement. Un travail sur cet aspect peut-il développer, d'une part, les compétences émotionnelles (identification et expression), et d'autre part, les habiletés sociales?

Nous avons donc élaboré des séances de groupe d'adolescents qui bégaiendent en nous inspirant de la démarche d'éducation émotionnelle. Cette démarche proposait une palette d'outils permettant d'explorer et d'exprimer ses ressentis afin d'améliorer la relation à soi et à autrui. Comment mettre en place cette démarche? Sous quelle forme? Est-elle applicable dans le cadre d'une prise en charge orthophonique du bégaiement en groupe? Si oui quel peut en être l'intérêt ? Pour répondre à ses questions, nous avons réalisé un questionnaire évaluant les compétences émotionnelles des adolescents de l'étude avant et après les ateliers de groupe. Une étude

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

longitudinale a également été réalisée analysant les habiletés sociales les plus déficitaires des adolescents à l'aide de la grille de Rustin.

Contact mail : [gaelle.crestel@gmail.com](mailto:gaelle.crestel@gmail.com)

**GAUBEY Astrid et GENDRY Capucine (Montpellier)**

Écriture et bégaiement : comparaison de l'écriture auprès d'enfants dysgraphiques bégues et fluents.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; CADILHAC Claire, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Le mémoire consiste à comparer une population d'enfants bégues dysgraphiques et d'enfants fluents dysgraphiques pour voir s'ils présentent les mêmes difficultés d'écriture, ou bien si les enfants bégues possèdent une écriture qui leur est spécifique.

Contact mail : [astridgaubey@yahoo.fr](mailto:astridgaubey@yahoo.fr) // [capugendry@wanadoo.fr](mailto:capugendry@wanadoo.fr)

**GAUBEY Astrid et GENDRY Capucine (Montpellier)**

Étude comparative des difficultés graphiques d'enfants bégues et fluents âgés de 7 à 11 ans.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université ; CADILHAC Claire, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Les recherches sur les étiologies du bégaiement ont mis en évidence certaines composantes neurologiques de ce trouble. Or, les commandes qui régissent la parole sont en partie communes avec celles qui régissent les gestes de l'écriture. Comparer l'écriture d'enfants bégues dysgraphiques et d'enfants fluents dysgraphiques pour ainsi mettre en avant des difficultés graphiques spécifiques aux enfants bégues peut nous permettre de mieux comprendre ce trouble et d'adapter notre prise en charge. Dans le cadre de notre étude, nous avons recruté 18 enfants âgés de 7 à 11 ans : 9 enfants bégues et 9 enfants fluores présentant tous une dysgraphie.

Nous avons proposé à nos participants l'échelle d'évaluation rapide de l'écriture chez l'enfant BHK. Afin d'analyser et comparer les résultats obtenus pour chaque item du test dans les deux groupes d'enfants. Nous observons que l'écriture des enfants bégues diffère de celle des enfants fluores avec un nombre plus important d'erreurs de télescopages et de lignes non planes. Cependant, nous ne relevons pas un seul type de dysgraphie au sein des personnes bégues. En effet, nous retrouvons des scripteurs lents et des scripteurs rapides, formant plus ou moins bien leurs lettres. Nos résultats ont été comparés à la revue de la littérature et critiqués dans les limites. Nous avons envisagé des perspectives pour notre étude. Même si le but de ce mémoire n'était pas de proposer une rééducation orthophonique, des pistes de travail ont été envisagées de manière à prendre en compte les troubles de l'écriture chez les enfants bégues.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

**JACQUIER Charlie (Tours)**

Création d'un outil d'évaluation des aspects visibles et audibles du bégaiement de l'adulte. Dirigé par : BREJON TEITLER Nadia, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr).

**LAURENT Natacha (Montpellier)**

Impact de la musicothérapie sur la parole bégue.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste ; BENSOUSSAN, Professionnel paramédical autre.

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Résumé : NC.Contact mail : [natacha2712@gmail.com](mailto:natacha2712@gmail.com)**PERCEVAULT Nolwenn (Nancy)**

Le bredouillement : enquête auprès des orthophonistes en vue de l'élaboration d'un site internet.

Dirigé par : ERCOLANI Françoise, Orthophoniste.

Résumé : NC.Contact mail : [nolwenn.percevault@yahoo.fr](mailto:nolwenn.percevault@yahoo.fr)**SALQUE Marion et VANNEAU Laura (Lyon)**

Impact du feedback vidéo sur la conscience et l'évolution des attitudes non-verbales de personnes qui bégaient.

Dirigé par : BRIGNONE Sylvie, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université. Résumé : Ce mémoire s'appuie sur l'approche cognitivo-comportementale du bégaiement. Six adolescents et adultes qui bégaient ont participé à cette étude de cas multiples réalisée sur six mois, à raison d'une rencontre par mois. Nous cherchons à montrer que la conscience et les attitudes non-verbales de la personne qui bégaye s'améliorent avec l'intervention. Le bégaiement étant un trouble complexe, il altère différentes strates de la communication.

Les évaluations portent sur le comportement non-verbal et paraverbal, l'authenticité de la communication et la sévérité du bégaiement de la personne qui bégaye. Nous employons les outils fiables que sont les grilles d'auto-évaluation et le feedback audiovisuel afin de réaliser une analyse quantitative et qualitative de la communication. Trois tâches de parole sont proposées au participant - lecture à voix haute, monologue et dialogue - suivies d'un débriefing portant sur son ressenti. Nous réalisons une hétéro-évaluation afin de comparer les notations du sujet à la réalité. Les hypothèses selon lesquelles la conscience du comportement nonverbal et le comportement lui-même s'améliorent grâce à l'intervention sont validées. En revanche, l'amélioration de la conscience du comportement au sein d'une séance grâce au feedback vidéo n'est pas démontrée. Ces résultats ainsi que l'amélioration du sentiment d'authenticité montrent l'importance d'une prise en charge globale. Les grilles, personnalisables par les orthophonistes, peuvent servir de ligne de base pour définir les difficultés et le projet thérapeutique du patient. Son évolution est mesurable grâce aux grilles et aux vidéos prises en séances.

Reproduire cet entraînement dans une modalité plus intensive permettrait d'obtenir des résultats plus significatifs sur le plan communicationnel.

Contact mail : [// laura.vanneau@gmail.com">salque.marion@gmail.com // laura.vanneau@gmail.com](mailto:salque.marion@gmail.com)**VASSEUR Julie (Lille)**

La perception du temps chez des enfants de 8 à 12 ans présentant un bégaiement.

Dirigé par : TOURNIER Christine, Orthophoniste.

Résumé : La pression temporelle évoquée par les personnes présentant un bégaiement m'a amené à me demander si ces personnes perçoivent le temps différemment des tout-venant. J'ai donc créé un protocole évaluant la perception à travers différents items (compter 30 secondes puis une minute dans sa tête, estimer la durée d'une conversation ou reproduire des structures rythmiques.). J'ai interrogé 53 enfants tout-venant et 19 enfants présentant un bégaiement, tous âgés de 8 à 12 ans.Contact mail : [julievasseur@live.fr](mailto:julievasseur@live.fr)**VILLEGAS Maud (Nancy)**

Prise en charge orthophonique de l'enfant d'âge préscolaire présentant un bégaiement associé à un retard de parole : intérêts et bénéfices des stimulations du rythme.

**CONTACTS**Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Dirigé par : BOCHET Brigitte, Orthophoniste

Résumé : NC.

Contact mail : [maud.villegas@gmail.com](mailto:maud.villegas@gmail.com)

**VOISIN Clémence (Nice)**

Réponse orale en situation de frustration : comparaison de sujets bégues et non bégues, de sujets musiciens et non musiciens.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste, Chargée d'enseignement à l'Université.

Résumé : Il existe une relation privilégiée entre l'expression musicale et l'expression verbale. D'après les éclairages théoriques de la première partie de ce mémoire, nous avons mesuré les nombreux apports de la musique concernant des domaines également nécessaires au domaine de la parole, du langage et de la communication. La pratique musicale permet une maîtrise de la respiration et de l'articulation des sons, une habileté des paramètres prosodiques que sont le rythme, le débit, la mélodie et les silences, une anticipation dans l'expression, une facilité d'évocation et d'improvisation, une aisance dans la structure syntaxique, un contrôle des émotions et une cohérence d'expression adaptée à la situation d'échange. Le bégaiement voit tous ces aspects expressifs perturbés, nous nous sommes donc demandé si l'expression des sujets bégues musiciens pouvait être plus aisée et plus performante que celle des sujets bégues non musiciens.

Notre protocole expérimental, élaboré à partir du test de Rosenzweig, a permis de mettre en évidence cette efficacité de la musique pour remédier à ces points sémiologiques. Ainsi, tant nos connaissances théoriques que leur mise en pratique ont montré que la pratique de la musique enrichissait l'expression orale et son utilisation pouvait donc être un recours très bénéfique auprès de sujets concernés par la pathologie du bégaiement.

Contact mail : [clems.voisin@gmail.com](mailto:clems.voisin@gmail.com)

**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## Année 2013 – 2014

### **DAILLY Clémentine (Tours)**

Diagnostic différentiel entre bégaiement et disfluences en fin de syllabes chez l'enfant. Dirigé par : BREJON LAMARTINIERE Nadia, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [clementinedailly@live.fr](mailto:clementinedailly@live.fr)

### **DELACOU Justine (Nantes)**

Pertinence de l'analyse conversationnelle dans la prise en charge du bégaiement du jeune enfant : études de cas.

Dirigé par : BERNARD Marie, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [justine.delacou@gmail.com](mailto:justine.delacou@gmail.com)

### **JOMAA Charline et LOPEZ Vanessa (Lyon)**

Évaluation des habiletés graphomotrices chez des enfants qui bégaient comparativement à des enfants tout-venant.

Dirigé par : NEFF Estelle, Orthophoniste ; TAMET-VILLARD Catherine, Orthophoniste

Résumé : Nous avons souhaité évaluer les prérequis à l'écriture chez des enfants qui bégaient scolarisés en GSM et en CP car nos recherches théoriques ont mis en avant un lien éventuel entre la motricité fine orofaciale et la motricité fine manuelle. Les résultats des enfants qui bégaient ont été comparés à ceux d'enfants tout-venant de même classe.

Contact mail : [memoire.jomaa.lopez@gmail.com](mailto:memoire.jomaa.lopez@gmail.com)

### **MENU Mathilde (Amiens)**

De l'intérêt du travail des pauses chez des patients bégues et/ou bredouilleurs : comparaison entre une rééducation classique et une rééducation spécifique.

Dirigé par : CARON-THEILLAUD Vanessa, Orthophoniste.

Résumé : L'utilisation de pauses dans le discours est indispensable à une bonne communication. Or chez les patients présentant un bégaiement et/ou un bredouillement, les pauses disparaissent ou interviennent aléatoirement, ce qui entraîne une détérioration de l'intelligibilité et surtout de la qualité de l'échange. Bien que le travail des pauses soit déjà abordé en rééducation orthophonique de façon empirique, aucun matériel ne permet un travail spécifique et systématique. Un protocole de travail des pauses a donc été élaboré, proposant une progression sur sept séances.

Il a pour objectif d'aider les patients à réduire leurs disfluences et à gagner en aisance en situation de communication grâce à des exercices variés. Ce protocole a été expérimenté auprès de huit patients suivis en rééducation orthophonique et comparé à une rééducation classique de durée équivalente. Par l'analyse des résultats sur cet échantillon, nous constatons une diminution des disfluences plus importante après la mise en place du protocole et une amélioration de l'aisance en situation de communication. Le protocole doit donc être envisagé comme un outil d'amélioration de la communication ainsi que d'aide à la diminution des disfluences.

Néanmoins, il ne peut constituer une rééducation à lui-seul et doit faire partie intégrante d'une rééducation plus globale. Dans la pratique orthophonique, il pourrait être utilisé à la fois comme un support d'exercices variés du travail des pauses mais aussi comme une rééducation spécifique grâce à la progression qu'il propose.

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Contact mail : [menumathilde@gmail.com](mailto:menumathilde@gmail.com)

**PERROY Claire (Nancy)**

L'impact des situations de communication et du comportement de l'interlocuteur sur la fluence de la parole : recueil des ressentis d'un adolescent et de deux jeunes adultes qui bégaient.

Dirigé par : BOCHET Brigitte, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [claire.perroy@hotmail.fr](mailto:claire.perroy@hotmail.fr)

**ROELTGEN Jeanne (Poitiers)**

Élaboration d'une méthode à médiation figurine soutenant la continuité de la prise en charge d'enfants bégues.

Dirigé par : KURZAWINSKI Amélie, Orthophoniste ; Dr MALLET, Pédopsychiatre.

Résumé : NC.

Contact mail : [jroeltgen@hotmail.com](mailto:jroeltgen@hotmail.com)

**SALDUCCI Coralie (Nice)**

Pauses et silences dans le discours : expérimentation dans le discours des bégues.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)

**TOMASI Margaux (Paris)**

Le programme Lidcombe : recherche sur l'efficacité de ce programme en France.

Dirigé par : AUMONT BOUCAND Véronique, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [margaux.tomasi@hotmail.fr](mailto:margaux.tomasi@hotmail.fr)

**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

## Année 2012 – 2013

### **BURGOT Hélène (Lille)**

Le rôle de l'orthophoniste dans l'intégration professionnelle des adultes porteurs de bégaiement.

Dirigé par : GODFRAIN MASSEMIN Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : Le bégaiement est un trouble de la communication qui peut avoir des conséquences dans le domaine social, personnel et professionnel. Nous avons choisi de nous intéresser au milieu professionnel, c'est-à-dire aux recherches d'emploi et à l'insertion professionnelle elle-même des personnes porteuses de bégaiement. Le but de cette étude est de rendre compte comment en tant qu'orthophoniste, nous pouvons intervenir dans leurs démarches liées à l'insertion professionnelle ainsi que de permettre un état des lieux de la situation professionnelle actuelle des adultes porteurs de bégaiement. Nous avons donc cherché à y répondre en créant deux questionnaires, l'un à l'intention des adultes qui bégaient et l'autre à l'intention des employeurs. Grâce à l'élaboration de ces deux questionnaires, nous avons décrit les attentes concrètes que les sujets bégues ont de l'orthophoniste par rapport à leur intégration professionnelle et sondé la perception des employeurs à propos des sujets bégues puis enfin comparé les cognitions des sujets bégues et celles des employeurs. Enfin, dans le but de d'élaborer un outil utile à la prise en charge orthophonique, nous avons créé deux brochures à destination des personnes qui bégaient qui sont à la recherche d'un emploi et pour des employeurs susceptibles de recruter une personne qui bégaye.

Contact mail : [helene.burgot@gmail.com](mailto:helene.burgot@gmail.com)

### **CARTESSE Laure (Lille)**

Bégaiement et vie sociale : prise en charge de l'adulte en individuel, ou en groupe à travers les jeux de rôle.

Dirigé par : GODFRAIN-MASSEMIN Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [laure.cartesse@etu.univlille2.fr](mailto:laure.cartesse@etu.univlille2.fr)

### **CORREIA Laura, HUET Cécile (Lille)**

BEG'ALLO ? Création d'un outil de rééducation orthophonique, basé sur les thérapies cognitivo-comportementales, visant à développer l'utilisation du téléphone chez les adolescents et adultes qui bégaient.

Dirigé par : GODFRAIN Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : Nous inscrivons notre matériel dans le cadre des thérapies cognitivo-comportementales dans le but de reconstituer une situation agréable entre la personne qui bégaye et son utilisation du téléphone. Le but de notre matériel est d'améliorer le ressenti de la personne bégue vis-à-vis du téléphone en lui permettant bien sûr de gérer au mieux ses disfluences qu'elles surviennent en conversation téléphonique mais surtout de diminuer ses angoisses autant que possible.

Contact mail : [laura.correia9@gmail.com](mailto:laura.correia9@gmail.com) // [cecilehuet@hotmail.fr](mailto:cecilehuet@hotmail.fr)

### **COTTE Julia et VIGANIGO Julie (Montpellier)**

Évaluation du rythme chez l'enfant qui bégaye.

Dirigé par : SIMON Anne-Marie, Orthophoniste.

Résumé : Nous émettons l'hypothèse que le sujet qui bégaye connaît un trouble du rythme qui n'est pas uniquement circonscrit à sa parole. En effet, nous supposons que le rythme sensori-moteur, les tempos moteurs

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

spontané et préféré, et le rythme social sont également perturbés chez l'enfant qui bégaiet. Pour évaluer cela, nous proposons différentes épreuves rythmiques (dont deux sont issues du Test de Mira Stambak) ainsi que des questionnaires sur le rythme social à des enfants non-fluents et fluents âgés de 8 à 10 ans.

Contact mail : [julia.cotte@gmail.com](mailto:julia.cotte@gmail.com) // [julie.viganigo@free.fr](mailto:julie.viganigo@free.fr)

#### **D'EPINAY Dauphine (Nantes)**

Bégaiement : Technique de fluence (ERASM) et qualité vocale. Étude auprès de cinq patients.

Dirigé par : BEAURIN Monique, Orthophoniste.

Résumé : L'objectif de ce mémoire est de montrer ce qu'apporte la technique de fluence (ERASM) à la qualité vocale de personnes qui bégaient et de voir comment les différents paramètres vocaux évoluent. Pour ce faire, nous avons réalisé des enregistrements auprès de cinq patients : un premier enregistrement en voix spontanée puis un deuxième avec application de l'ERASM. Nous avons ensuite effectué une analyse vocale subjective, grâce au jugement d'un jury d'écoute, et une analyse vocale objective, à partir du logiciel Praat. Nous nous sommes concentrées sur quelques éléments vocaux : l'asthénie, les forçages, la stabilité, la richesse du timbre, la qualité des attaques et la congruence de la mélodie. Nous avons cherché à voir ce qui était modifié et comment, selon la situation de la parole et pour chaque patient. Nous avons ainsi pu constater que l'ERASM permet une diminution du forçage vocal et une amélioration de la qualité des attaques. En revanche, son rôle dans l'amélioration de l'asthénie et de la stabilité varie beaucoup d'un patient à un autre. Quant au timbre, l'ERASM a permis un enrichissement pour la voix d'un seul patient : celui qui se sert très fréquemment de la technique de fluence.

Contact mail : [dauph2rock@hotmail.fr](mailto:dauph2rock@hotmail.fr)

#### **DAUGA Emilie (Poitiers)**

Approche systémique du bégaiement chez l'enfant de moins de 5 ans : production d'un outil de médiation familiale.

Dirigé par : TANDONNET Louis, Psychiatre ; HELLIO Emilie.

Résumé : NC.

Contact mail : [emilie.desbordes@wanadoo.fr](mailto:emilie.desbordes@wanadoo.fr)

#### **GARCIA GASNIER Marie et SOULIER Guilaine (Montpellier)**

Étude longitudinale du bégaiement avant et après pratique de la relaxation pneumo-phonique: apports de cette approche manuelle.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste ; BRUN Jean-Louis.

Résumé : NC.

Contact mail : [mariegasnier@hotmail.com](mailto:mariegasnier@hotmail.com) / [guilaine.soulier@gmail.com](mailto:guilaine.soulier@gmail.com) .

#### **GOYET Laura (Montpellier)**

Étude des effets des doubles tâches sur la parole de locuteurs qui bégaient en comparaison avec la parole de locuteurs normo-fluents.

Dirigé par : HIRSCH Fabrice, Chercheur en sciences du langage ; BRU Jacqueline, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [laura.goyet@gmail.com](mailto:laura.goyet@gmail.com)

#### **GROSGURIN Marion (Nice)**

Analyse sémiologique du bégaiement à partir d'œuvres choisies de Lewis Carroll.

## CONTACTS

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Dirigé par : OSTA Arlette, Chargée de cours dans le centre de formation.

Résumé : Mise en perspective du récit de fiction d'un écrivain bégue avec la sémiologie et les données actuelles du bégaiement.

Contact mail : [marion.grosgrin@gmail.com](mailto:marion.grosgrin@gmail.com)

**MENNECIER Clémence et DE LAJUDIE Marie-Cécile (Paris)**

La perception du bégaiement de l'enfant dans différentes langues en fonction de l'expérience de l'évaluateur.

Dirigé par : AUMONT-BOUCAND Véronique, Orthophoniste.

Résumé : Notre étude cherche à voir dans quelle mesure les experts et moins experts s'accordent pour juger la sévérité d'enfants d'âge préscolaire dans différentes langues. Nous avons présenté 7 vidéos d'enfants parlant chacun une langue différentes à 3 groupes : un groupe d'orthophonistes spécialisés dans le bégaiement, un groupe d'orthophonistes non spécialisés, un groupe d'auditeurs "naïfs". Le but était de comparer leur perception de la sévérité et la confiance avec laquelle ils prononçaient ces jugements.

Contact mail : [clemencemennecier@yahoo.fr](mailto:clemencemennecier@yahoo.fr)

**LORENZINI Elsa (Montpellier)**

Le bégaiement : étude acoustique des effets d'une rééducation orthophonique chez l'enfant et évolution perçue par les parents au fil des séances.

Dirigé par : BRU Jacqueline, Orthophoniste ; HIRSCH Fabrice.

Résumé : L'objectif de cette étude est d'observer l'évolution de la parole de 4 enfants âgés de 5 à 7 ans pris en charge par une orthophoniste pour un bégaiement. Nous effectuons des transcriptions de corpus obtenus à partir d'entretiens individuels réalisés toutes les 3 semaines pendant 6 mois. Nous comptabilisons à chaque temps le nombre et l'intensité des disfluences (répétitions, prolongements, pauses) et nous relevons la vitesse d'articulation et la vitesse d'élocution. Parallèlement, nous demandons aux parents de renseigner un questionnaire d'observation du bégaiement de leur enfant, puis nous comparons leurs réponses aux observations faites sur les données des corpus.

Notre première hypothèse est que le rythme de la parole des enfants devrait devenir plus harmonieux au fil du temps, grâce à l'atténuation des disfluences. Notre seconde hypothèse est que les parents devraient sous-estimer la progression de leur enfant.

Contact mail : [elsa.lorenzini@hotmail.fr](mailto:elsa.lorenzini@hotmail.fr)

**PELISSON Cyrielle (Nice)**

Humour et Bégaiement : Perception, compréhension et utilisation de l'humour chez l'enfant bégue.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [c.pelisson@hotmail.fr](mailto:c.pelisson@hotmail.fr)

**WARGA Laurie (Nice)**

Le test du bonhomme chez l'enfant bégue.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste ; CONTANT Maurice.

Résumé : Recherche d'éléments sémiologiques du bégaiement à travers la passation du test du bonhomme de J. Royer chez 24 sujets bégues âgés de 4 à 10 ans.

Contact mail : [laurie.warga@gmail.com](mailto:laurie.warga@gmail.com)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2011-2012**

**FOURNIER Gaëlle et TRILLAUD Floriane (Lille)**

La place du corps dans la prise en charge de bégaiement, transdisciplinarité.

Dirigé par : DODIN ; GODFRAIN.

Résumé : NC.

Contact mail : [floriane.trillaud@hotmail.fr](mailto:floriane.trillaud@hotmail.fr)

**GOALARD Manon (Lille)**

Création d'un coffret livret-DVD afin de sensibiliser les orthophonistes à l'intérêt de l'art thérapie dans la prise en charge du bégaiement et propositions d'ateliers adaptables en séances.

Dirigé par : GODFRAIN.

Résumé : NC.

Contact mail : [manongoalard@hotmail.fr](mailto:manongoalard@hotmail.fr).



**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2010-2011**

**JARRY Solène et THOMAS Sophie (Tours)**

Classes grammaticales les plus bégayées chez l'adulte, en fonction de la fréquence et de la longueur.

Dirigé par : BREJON-LAMARTINIERE Nadia.

Résumé : NC.

Contact mail : [solene.jarry@sfr.fr](mailto:solene.jarry@sfr.fr) // [sophiethomas906@gmail.com](mailto:sophiethomas906@gmail.com) .

**VICHET Marlène (Strasbourg)**

La prise en charge orthophonique de groupe des patients adolescents et adultes qui bégaient.

Dirigé par : LATOUR-HENG Yolaine.

Résumé : Lorsque le bégaiement est installé, de nombreux patients adolescents ou adultes prennent conscience de leurs difficultés de parole et de communication. Cette prise de conscience s'accompagne généralement d'une perturbation des habiletés sociales. La prise en charge orthophonique en groupe est alors particulièrement indiquée afin d'explorer et de développer les compétences verbales et non verbales du sujet et consolider l'affirmation de soi. En me plaçant du point de vue du patient, je tâcherai dans ce projet, de comprendre quels processus et quels impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont induits par ce mode de prise en charge. Mon étude s'appuiera pour cela sur différents groupes de prise en charge à Strasbourg, Paris et Grenoble.

Contact mail : [marlene.vichet@hotmail.fr](mailto:marlene.vichet@hotmail.fr)



**FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2009-2010**

**CASTELLANOS Elise et DE COUNE Fanny (Lille)**

Begotextes : Création de textes destinés à la prise en charge orthophonique de l'enfant présentant un bégaiement.  
Dirigé par : GODFRAIN-MASSELIN Isabelle.

Résumé : NC.

Contact mail : [fannydecoune@hotmail.com](mailto:fannydecoune@hotmail.com) // [castel59@msn.com](mailto:castel59@msn.com)

**COUSIN Chloé (Nantes)**

Contes thérapeutiques dans le traitement hypnotique du bégaiement.

Dirigé par : SAFIEDDINE Amer

Résumé : NC.

Contact mail : [chloe.cousin@laposte.net](mailto:chloe.cousin@laposte.net)



**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

**Année 2008-2009**

**BRESSON Aurélien (Strasbourg)**

Le bégaiement et les troubles de l'évocation.

Dirigé par: Yolaine LATOUR HENG.

Résumé : NC.

Contact mail : [aurelien.bresson@laposte.net](mailto:aurelien.bresson@laposte.net)

**CHEMIN Carole (Nantes)**

Le bégaiement chez les enfants d'âges scolaires : quelles difficultés rencontrent-ils à l'école à cause de leur bégaiement ?

Dirigé par : QUENTEL Jean-Claude.

Résumé : NC.

Contact mail : [carole.chemin@laposte.net](mailto:carole.chemin@laposte.net)

**DE BEAUREPAIRE Alice et GOSSELLIN Béatrice (Lyon)**

Travail vocal dans le cadre de la prise en charge orthophonique de l'enfant en période de latence présentant un bégaiement. Intérêt, description, proposition d'évaluation à partir de quatre cas.

Dirigé par : DE CHASSEY Juliette, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [dbalice@gmail.com](mailto:dbalice@gmail.com) // [irbis69@hotmail.com](mailto:irbis69@hotmail.com)

**DEGRAEVE Isabelle (Paris)**

Intérêt de la pratique du théâtre chez l'enfant d'âge scolaire qui bégaiet.

Dirigé par : SIMON Anne-Marie.

Résumé : NC.

Contact mail : [isadegr\\_93@hotmail.com](mailto:isadegr_93@hotmail.com)

**DELEBARRE Marie-Christine et FRANKE Sandie (Lille)**

Application d'un programme d'entraînement à l'évocation lexicale sur 13 enfants bégues de 6 à 12 ans et analyse de son influence sur les disfluences.

Dirigé par : GODFRAIN-MASSEMAIN Isabelle, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [mcdelebarre@orange.fr](mailto:mcdelebarre@orange.fr) // [sandiefranke@yahoo.fr](mailto:sandiefranke@yahoo.fr)

**GAREAU Claire (Lille)**

La prévention du bégaiement : création d'un matériel pour des actions de sensibilisation auprès des professionnels de la petite enfance.

Dirigé par : GODFRAIN-MASSEMIN Isabelle ; MAICKIEWICZ.

Résumé : NC.

Contact mail : [clairegareau@hotmail.fr](mailto:clairegareau@hotmail.fr)

**GOSSET Prescillia et GOSSET Claire (Paris)**

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29

Capacités syntaxiques de l'adulte présentant un bégaiement développemental : étude exploratoire de 8 cas.

Dirigé par : GILLES Olivier.

Résumé : NC.

Contact mail : [chouquette\\_5@hotmail.fr](mailto:chouquette_5@hotmail.fr) // [claire.g@laposte.net](mailto:claire.g@laposte.net)

**MANACH Marion (Tours)**

Adaptation du test américain The Stocker Probe, évaluation du lien entre le niveau de demande et de complexité syntaxique et le bégaiement du jeune enfant : étude de 24 enfants qui bégiaient entre 3 et 10 ans.

Dirigé par : BREJON-LAMARTINIERE Nadia, Orthophoniste.

Résumé : NC.

Contact mail : [manach.marion@voila.fr](mailto:manach.marion@voila.fr)

**PREVOSTO Sébastien (Nice)**

Bégaiement et temporalité.

Dirigé par : OSTA Arlette, Orthophoniste ; CONTANT Maurice.

Résumé : NC.

Contact mail : [sebastienprevosto@yahoo.fr](mailto:sebastienprevosto@yahoo.fr)

**QUEVAL Julie (Montpellier)**

Insertion professionnelle chez adultes bégues.

Dirigé par : BRU J.

Résumé : NC.

Contact mail : [jufairy83@hotmail.fr](mailto:jufairy83@hotmail.fr)

**RIO Maïwenn (Lille)**

Les cartes de Gagouill : création d'un jeu destiné aux enfants présentant un bégaiement et à leur entourage.

Dirigé par : GODFRAIN-MASSEMIN Isabelle.

Résumé : NC.

Contact mail : [maiwenn.rio@orange.fr](mailto:maiwenn.rio@orange.fr)

**SENDRA Amélie et THIOLON Louise (Montpellier)**

Étude des habiletés sociales chez les parents d'enfants bégues.

Dirigé par : NC.

Résumé : NC.

Contact mail : [misslilie@hotmail.com](mailto:misslilie@hotmail.com) / [louise.thiolon@hotmail.fr](mailto:louise.thiolon@hotmail.fr)

**SOUDANS Delphine (Nantes)**

Théorie de l'Esprit et Bégaiement.

Dirigé par : MONFRAIS-PFAUWADEL Marie-Claude.

Résumé : NC.

Contact mail : [soudansdelphine@yahoo.fr](mailto:soudansdelphine@yahoo.fr)

**CONTACTS**

Benjamin BOH  
Président  
[présidence@fneo.fr](mailto:présidence@fneo.fr)  
06.99.63.01.11

Agathe PHILIPP  
Vice-présidente en charge  
de la recherche  
[recherche@fneo.fr](mailto:recherche@fneo.fr)  
06.59.16.80.29